

MENTORIA EBSE RH/IBFC SES-DF/TJ-MG/Prefeitura de Contagem-MG/2022

Aula nesta quarta-feira, 11/10, às 20h.
83 questões comentadas

1

(SES-DF/IBFC/2022) A classificação de risco é um processo decisivo de identificação dos pacientes que precisam de tratamento imediato de acordo com grau de agravo à saúde baseado em protocolo. Considerando a escala proposta pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Vermelho - trata-se de atendimento de urgência, indica prioridade 1.
- b) Amarelo – trata-se de atendimento o mais rápido possível, indica prioridade 2.
- c) Azul – trata-se consulta de baixa complexidade de atendimento, de acordo com o horário de chegada, indica prioridade 3.
- d) Verde – prioridade não urgente, indica prioridade 3.
- e) Laranja – atendimento não urgente, indica prioridade 4.

2

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) A parada cardiorrespiratória caracteriza-se pela interrupção súbita da circulação sanguínea e mecanismo ventilatório de um indivíduo. De acordo com as Diretrizes da American Heart Association de 2020, para a ressuscitação cardiopulmonar se efetivar, assinale a alternativa incorreta.

- a) É recomendado a desfibrilação sequencial dupla para ritmo chocável refratário.


b) É aconselhável para os profissionais tentarem, primeiro, estabelecer o acesso intravenoso para administração de medicamento em parada cardiorrespiratória, e caso não seja possível, estabelecer, então, acesso intraósseo.

c) O número de compressões adequado deve atingir 100 a 120 compressões por minuto, com profundidade de 5cm, com retorno total do tórax.

d) Adicionado o elo de recuperação na cadeia de sobrevivência intra e extra hospitalar.

3

(SES-DF/IBFC/2022) O Enfermeiro realizou um eletrocardiograma do paciente, que apresentou um ritmo cardíaco com as seguintes características: frequência elevada e desorganizada; ritmo irregular, com ondas que variam em tamanho e forma; e sem complexos QRS de aparência normal, conforme figura abaixo.



Fonte: AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2012

É correto afirmar que o ritmo cardíaco apresentado se refere à(ao):

- a) Assistolia.
- b) Fibrilação Ventricular.
- c) Taquicardia ventricular.
- d) Fibrilação Atrial.
- e) Bloqueio Atrioventricular.

4

(TJ-MG/IBFC/2022) O Eletrocardiograma (ECG) é um procedimento não invasivo para diagnóstico das arritmias cardíacas. A figura a seguir representa o ritmo cardíaco de um paciente com frequência cardíaca menor que 60 bpm, intervalo RR regular, morfologia QRS normal e atividade atrial presente. Considerando o ritmo cardíaco apresentado, assinale a alternativa correta.



Fonte: Campanharo, CRV e col. Guia de bolso para assistência em Enfermagem. Ed. Atheneu, 2017p.60.

- a) Bradicardia Sinusal.
- b) Taquicardia Sinusal.
- c) Fibrilação ventricular.
- d) Bloqueio atrioventricular.
- e) Flutter atrial.

5

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) O único tratamento prático definitivo para FV (Fibrilação ventricular) é a desfibrilação elétrica. Assinale a alternativa que apresenta qual o tipo de fonte energética dos desfibriladores é considerada mais efetiva e segura, atualmente.

- a) Não sincronizadas.
- b) Corrente alternada (AC).
- c) Sincronizado.
- d) Corrente contínua (DC).

6

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Obstrução de via aérea por corpo estranho (OVACE) é um quadro súbito bastante comum, a manobra utilizada na pessoa engasgada onde utiliza-se as mãos sobre o diafragma provocando tosse é chamada de _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Manobra de Heimlich.
- b) Manobra de Valsalva.
- c) Manobra de Chin-Lift.
- d) Manobra de Jaw-Thrust.

7

(SES-DF/IBFC/2022) Existem vários dispositivos para suplementação de oxigênio de acordo com a concentração desejada e a circunstância clínica do paciente. O (A) _____ é um sistema de baixo fluxo, sendo que o aumento de fluxo na ordem de 1 litro/minuto irá aumentar a concentração de oxigênio inspirado em cerca de 4%. O fluxo de 1 a 6 litros por minuto fornece uma concentração de oxigênio de 24 a 44%.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Máscara de Venturi.
- b) Cateter nasal.
- c) Máscara facial simples.
- d) Tubo endotraqueal.
- e) Ambu.

8

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Na abordagem das intoxicações exógenas agudas, a estabilização clínica do paciente é a prioridade, e evitar a absorção completa da substância a qual foi exposto. O uso do carvão ativado é indicado nas intoxicações por via oral em até _____ (36% de recuperação do tóxico).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 30 minutos.
- b) 60 minutos.
- c) 90 minutos.
- d) 120 minutos.

9

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) A gasometria é um exame de sangue feito através da coleta de sangue arterial, com objetivo de analisar os gases presentes, suas distribuições, o pH e o _____ no sangue.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) HCO₃ (Bicarbonato de sódio).
- b) pCO₂ (Pressão parcial do gás carbônico).
- c) Equilíbrio ácido-base.
- d) Ânion Gap (AG).

10

(SES-DF/IBFC/2022) O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema que acomete um grande número de pessoas no Brasil e no mundo. Sobre AVC, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() É uma doença que se caracteriza pelo comprometimento previsível da função cerebral como resultado da circulação cerebral.

() O AVC Isquêmico ocorre quando existe extravasamento de sangue para dentro do cérebro ou do espaço subaracnóideo, por rompimento de algum vaso sanguíneo.

() Os sinais e sintomas dos distúrbios vasculares que ocorrem no cérebro dependem da localização, do tamanho da área do cérebro que teve a irrigação sanguínea prejudicada e da existência de outros vasos sanguíneos que possam ajudar a irrigar a região atingida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - V.
- b) F - V - V.
- c) V - V - V.
- d) V - F - F.
- e) F - V - F.

11

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Os AVCs (Acidente Vascular Cerebral) estão entre as principais causas de morte e incapacidade física em todo o mundo, a escala de Cincinnati consiste na identificação precoce do AVC em ambiente pré-hospitalar, mediante três parâmetros ectoscópicos que estão presentes na maioria das vítimas. Assinale a alternativa que não faz parte desta escala.

- a) Déficit motor.
- b) Desvio de rima labial.
- c) Palavras desconexas.
- d) Alterações na fala.

12

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Por meio do protocolo XABCDE do ATLS 10, um mnemônico para atendimento inicial da vítima politraumatizada, é possível definir a prioridade

do trauma e as lesões que colocam a vida do paciente em risco. Assinale a alternativa correspondente à letra X desse protocolo.

- a) Exposição do paciente
- b) Circulação e controle de hemorragias internas
- c) Hemorragia externa grave
- d) Avaliação das vias aéreas e da coluna cervical

13

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) O nível de consciência de uma pessoa é um fator essencial para que sejam determinadas as necessidades assistenciais, principalmente daqueles que apresente traumas neurológicos. Em 2018 foram feitas mudanças na escala de coma de Glasgow.

Assinale a alternativa correta a respeito da mudança ocorrida nesta escala.

- a) Avaliação Motora.
- b) Avaliação Ocular.
- c) Avaliação resposta verbal.
- d) Avaliação da Reação pupilar.

14

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Os sintomas de hematoma epidural geralmente se desenvolvem dentro de minutos ou de muitas horas após a lesão (o período sem sintomas é chamado intervalo de lucidez). São sintomas de Hematoma epidural, exceto _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) cefaleia aumentando de intensidade.
- b) diminuição do nível de consciência.
- c) sinal de Battle.
- d) déficits neurológicos focais.

15

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Pacientes em terapia intensiva e mantidos com drogas vasoativas é mais difícil estimar a adequação do volume intravascular. Nesses casos, pode ser preciso utilizar medidas complementares para avaliação da volemia. Estas incluem:

- I. A pressão venosa central.
- II. A saturação venosa de oxigênio.

III. Ecocardiografia.
IV. Testes dinâmicos de volemia.
Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) I, II e IV apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e II apenas.

16

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas abaixo.

I. A Tuberculose é uma doença de transmissão aérea e ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, pelo espirro ou pela fala de pessoas com tuberculose pulmonar ou laríngea.

II. Somente a pessoa portadora de tuberculose laríngea ativa transmite a doença.

III. Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não desempenham papel importante na transmissão da doença.

IV. O principal reservatório é o ser humano. Outros possíveis reservatórios são gado bovino, primatas e outros mamíferos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV.
- b) I e IV apenas.
- c) I apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, III e IV apenas.

17

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a Dengue e suas fases clínicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Na fase febril: a lesão exantemática, presente em grande parte dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros, não poupando regiões palmares e plantares. O exantema também pode se apresentar sob outras formas, com ou sem prurido.

() Fatores de risco individuais como idade, etnia ou doenças associadas não interferem na gravidade dessa doença.

() Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem na fase crítica. A maioria deles é resultante do aumento da permeabilidade capilar.

() Na fase de recuperação, observa-se melhora do estado geral do paciente, retorno progressivo do apetite, redução de sintomas gastrointestinais, estabilização do estado hemodinâmico e melhora do débito urinário. Alguns pacientes podem apresentar um exantema, acompanhado ou não de prurido generalizado. Bradicardia e mudanças no eletrocardiograma são comuns durante esse estágio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - F - V.
- b) F - F - V - V.
- c) V - F - V - V.
- d) F - F - F - V.
- e) V - V - V - V.

18

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a doença da Raiva, assinale a alternativa correta.

a) O período de incubação é extremamente variável, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano. Em crianças, o período de incubação tende a ser menor que no indivíduo adulto.

b) O período de incubação não está relacionado à localização, à extensão e à profundidade da mordedura, da arranhadura, da lambadura ou do contato com a saliva de animais infectados.

c) O período de incubação está diretamente relacionado apenas com a distância entre o local do ferimento, do cérebro e troncos nervosos.

d) Em toda espécie animal, inclusive para os quirópteros, o período de incubação é igual, que varia de 07 a 30 dias.

e) Nos cães e nos gatos a eliminação de vírus pela saliva ocorre de dois a sete dias após o aparecimento dos sinais clínicos e vai diminuindo durante a evolução da doença.

19

(SES-DF/IBFC/2022) A notificação de suspeitas de queixas técnicas e/ou reações adversas não desejadas manifestadas após o uso de medicamentos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes, derivados do sangue, entre outros, deve ser realizada a comunicação por meio do _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Sistema de Notificação Sanitária – NOTIVISA.
- b) Sistema de Informações – DATASUS.
- c) Sistema de Notificação Epidemiológica – NOTIEPI.
- d) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
- e) Sistema de Vigilância da Organização Mundial da Saúde - VIGI-OMS.

20

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a investigação epidemiológica e notificação dos casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A notificação das doenças e dos agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de Notificação tem caráter estritamente epidemiológico e de vigilância.

() As intoxicações exógenas suspeitas e confirmadas relacionadas ao trabalho também devem ser notificadas em ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

() Os casos de doenças e de agravos relacionados ao trabalho devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação somente após a confirmação da relação com o trabalho, por meio da investigação epidemiológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V.
- b) F - F - V.
- c) F - V - V.
- d) F - V - F.
- e) V - F - F.

21

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) São doenças de notificação compulsória:

- I. SARS-CoV; Botulismo; Doença de Chagas.
- II. Síndrome de Rubéola Congênita, Febre Amarela.
- III. Tularemia, Dengue; Sarampo; Influenza.
- IV. Antraz, IAM, Chikungunya.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) I, II e IV apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I apenas.

22

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) A etiologia de causa viral menos comum da insuficiência hepática aguda é _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Hepatite B.
- b) Hepatite D.
- c) Hepatite C.
- d) Toxidade por paracetamol.

23

(TJ-MG/IBFC/2022) A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. No tratamento da Sífilis recente (primária, secundária e latente recente), com menos de um ano de evolução utiliza-se:

- a) Benzilpenicilina benzatina, 600.000 UI, intramuscular, dose única, sendo 1 aplicação por semana, repetindo-se por 3 semanas).
- b) Benzilpenicilina benzatina, 1,2 milhões UI, intramuscular, dose única (0,6 milhão UI em cada glúteo).
- c) Benzilpenicilina benzatina, 300.000 UI, intramuscular, dose única.
- d) Benzilpenicilina benzatina, 1,2 milhões UI, intramuscular, dose única, em uma única aplicação (1 glúteo apenas).
- e) Benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, intramuscular, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo).

24

(SES-DF/IBFC/2022) A Portaria MS/GM nº 529/2013 institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Considerando os conceitos de cultura de segurança do paciente descritos nesta portaria, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares.

() Cultura que encoraja e recompensa a unidade que não possui nenhuma notificação de falhas.

() Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais.

() Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove a punição com a finalidade de evitar novos eventos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - V.
- b) V - V - F - V.
- c) V - F - V - F.
- d) V - V - V - V.
- e) V - F - F - V.

25

(SES-DF/IBFC/2022) Qualquer efeito nocivo, não intencional e indesejado de um medicamento, observado em doses terapêuticas habituais utilizadas em seres humanos para fins de profilaxia, diagnóstico ou tratamento é correto afirmar que é denominado (a) _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) ineficácia terapêutica.
- b) queixa técnica.
- c) desvio de qualidade.
- d) alteração organoléptica do medicamento.
- e) reação adversa a medicamento.

26

(TJ-MG/IBFC/2022) O paciente LMO, 67 anos, foi internado com suspeita de Tuberculose Pulmonar na unidade de isolamento do hospital. Quanto ao tipo de precaução para transmissão de microrganismos, para o paciente citado é correto afirmar que deve ser colocado:

- a) em quarto não privativo e aguardar confirmação laboratorial para colocá-lo isolamento rigoroso.
- b) em quarto privativo e adotar medidas para transmissão de contato.
- c) em quarto privativo e adotar medidas para transmissão de gotículas.
- d) em quarto não privativo e adotar precauções padrão.
- e) em quarto privativo e adotar medidas para transmissão de aerossóis.

27

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Durante a visita domiciliar a um paciente diagnóstica com COVID 19, a técnica em enfermagem da unidade de saúde da família deve utilizar _____, equipamento adequado para impedir que o profissional respirem gotículas provenientes da tosse ou espirro do paciente. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna sobre o Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- a) Máscara cirúrgica.
- b) Máscara N95.
- c) Máscara PFF1.
- d) Máscara de tecido.

28

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos (microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons).

Assinale a alternativa que apresenta qual norma regulamentadora abrange as situações de exposição aos diversos agentes de risco presentes no ambiente de trabalho, como os agentes de risco biológico.

- a) Norma Regulamentadora - NR 30.
- b) Norma Regulamentadora - NR 31.
- c) Norma Regulamentadora - NR 32.
- d) Norma Regulamentadora - NR 33.

29

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) O cateterismo venoso periférico é amplamente utilizado podendo apresentar algumas complicações. Em relação a complicações locais, assinale a alternativa incorreta.

- a) Flebite.
- b) Extravazamento.
- c) Hematoma.
- d) Sobrecarga circulatória.

30

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) A flebite é uma lesão complexa. A inflamação pode ser causada pela solução e/ou fármaco administrado, fatores de risco que incluem a administração de soluções hiperosmolares ou com extremos de pH, rápida infusão, diluição inapropriada e presença de partículas na solução infundida. Em se tratando da classificação de flebite, assinale a alternativa correta em relação as causas descritas.

- a) Mecânica.
- b) Infecçiosa.
- c) Pós infusional.
- d) Química.

31

(SES-DF/IBFC/2022) O Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) é o conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, para a máxima redução possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Considerando o PCIH, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar.
- II. Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores.

III. O presidente ou coordenador da CCIH será obrigatoriamente um profissional médico, indicado pela direção do hospital.

IV. Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um enfermeiro.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e IV apenas.
- c) I, II e III apenas.
- d) III apenas.
- e) I e II apenas.

32

(SES-DF/IBFC/2022) As dermatoses ocupacionais são quaisquer alterações da pele, da mucosa e dos anexos e de etiologia multifatorial. Assinale a alternativa correta que indique um fator de causa direta de dermatose ocupacional.

- a) Idade.
- b) Agentes mecânicos.
- c) Sexo.
- d) Etnia.
- e) Antecedentes de saúde.

33

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre o estabelecimento da relação das doenças e dos agravos com o trabalho, analise as afirmativas.

I. O processo de investigação da relação entre a doença ou o agravo com o trabalho deve ser realizado, de preferência, por uma equipe multidisciplinar.

II. Para estabelecimento da relação com o trabalho, deve-se considerar a anamnese ocupacional, o exame clínico, a avaliação de relatórios e exames complementares, a história clínica e ocupacional atual e pregressa do trabalhador.

III. A investigação epidemiológica e o estabelecimento da relação com o trabalho pode ser realizada somente pelo médico do trabalho.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III apenas.
- b) II apenas.
- c) I e II apenas.
- d) III apenas.
- e) I, II e III.

34

(SES-DF/IBFC/2022) Em atenção ao disposto na Resolução-RDC nº 63 de 2011, a qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O serviço de saúde deve possuir regimento interno ou documento equivalente, atualizado, contemplando a definição e a descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas e assistenciais, responsabilidades e competências.
- b) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são orientadas primeiramente à redução dos riscos inerentes a prestação de serviços de saúde.
- c) O serviço de saúde deve estar inscrito e manter seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Boas Práticas de Funcionamento (CNBPF).
- d) O serviço de saúde deve ter um responsável técnico (RT) e um substituto.
- e) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços.

35

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) O processo de eliminação de quase todos os microrganismos de objetos inanimados, com exceção de esporos bacterianos corresponde a um conceito. Assinale a alternativa correta sobre ele.

- a) Desinfecção.
- b) Assepsia.
- c) Limpeza.
- d) Esterilização.

36

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Dentre os materiais listados abaixo, qual não pode passar pelo processo de esterilização por autoclave. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Campos cirúrgicos.
- b) Materiais de borracha.
- c) Aventais.
- d) Materiais de terapia respiratória.

37

(TJ-MG/IBFC/2022) Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções em categorias. Considerando um exemplo de artigo crítico, assinale a alternativa correta.

- a) Máscaras de ambú.
- b) Circuitos de respiradores.
- c) Instrumental cirúrgico.
- d) Cabo de laringoscópio.
- e) Comadres.

38

(TJ-MG/IBFC/2022) Sobre o Centro de Material de Esterilização (CME), analise as afirmativas a seguir.

I. No CME e na empresa processadora destinadas à assistência humana é proibido processar produtos para saúde oriundos de procedimentos realizados em animais, incluindo cirurgias experimentais.

II. A responsabilidade pelo processamento dos produtos na empresa processadora é do Representante Legal.

III. Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.

IV. Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) III e IV apenas.
- c) I, III e IV apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, II, III e IV.

39

(SES-DF/IBFC/2022) Em conformidade com o preceituado no âmbito da Resolução-RDC nº 63 de 2011, a qual dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, pode ser indicada como correta a seguinte definição:

a) Responsável Técnico - RT: profissional com formação superior ou técnica com suas competências atribuídas por lei.

b) Prontuário do Paciente: documento que deve acompanhar o paciente em caso de remoção para outro serviço, contendo minimamente dados de identificação, resumo clínico com dados que justifiquem a transferência e descrição ou cópia de laudos de exames realizados, quando existentes.

c) Política de Qualidade: documento emitido pelo órgão sanitário competente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária.

d) Serviço de Saúde: conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos, eventos adversos e danos desnecessários durante a atenção prestada nos serviços de saúde.

e) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS): documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos de saúde, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

40

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) A Resolução da Diretoria Colegiada nº 222, de 28 de março de 2018, regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Os resíduos de serviços de saúde, devem ser segregados no momento de sua geração, conforme classificação por Grupos. Análise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Os resíduos classificados como Grupo A, são resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.

() Os resíduos classificados como Grupo B, são resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade.

() Os resíduos classificados como Grupo C, são materiais que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

() Os resíduos classificados como Grupo D, são resíduos que apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde, mas não ao meio ambiente.

() Os resíduos classificados como Grupo E, são materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; ponteiros de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V - F.
- b) V - V - V - F - V.
- c) F - F - F - V - F.
- d) F - V - F - F - V.

41

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Os sacos para acondicionamento de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de _____ de sua capacidade ou então a cada _____ independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 1/3 (um terço) / 48 (quarenta e oito) horas.
- b) 2/3 (dois terços) / 24 (vinte e quatro) horas.
- c) 2/3 (dois terços) / 72 (setenta e duas) horas.

d) 2/3 (dois terços) / 48 (quarenta e oito) horas.

42

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Paciente M. J, 45 anos, sexo feminino, mora em frente a um Pronto Atendimento na cidade de Cândido Rodrigues interior de São Paulo. A unidade estava realizando o dia de Combate a prevenção da Hipertensão. Ao verificar seu dado vital, verificou-se 145x95 mmHg. Baseado nos parâmetros do Programa de Controle da Hipertensão Arterial do Ministério esses valores correspondem a _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) pré hipertensão ou limítrofe.
- b) hipertensão grave.
- c) hipertensão estágio 2.
- d) hipertensão estágio 1.

43

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) A aferição da pressão arterial permite guiar condutas terapêuticas individuais, monitorar prevalências populacionais e identificar fatores de risco associados à hipertensão arterial. Em relação ao posicionamento correto do paciente durante a aferição da pressão arterial, assinale a alternativa incorreta.

- a) Posição sentada.
- b) Pernas cruzadas.
- c) Pés apoiados no chão.
- d) Dorso recostado na cadeira.

44

(TJ-MG/IBFC/2022) Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco para doenças cardiovasculares recomenda-se o uso do score de Framingham. Considerando os achados do exame clínico e anamnese, baixo risco ou risco intermediário para doença cardiovascular, assinale a alternativa correta.

- a) Nefropatia.
- b) Acidente vascular cerebral (AVC) prévio.
- c) Tabagismo.
- d) Retinopatia.
- e) Diabetes Mellitus.

45

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre as recomendações para o armazenamento da insulina, assinale a alternativa correta.

- a) Somente após três meses do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. Por isso, é importante orientar que a pessoa anote a data de abertura no frasco.
- b) Em viagens, colocar o frasco em bolsa térmica ou caixa de isopor, com gelo comum ou gelo seco.
- c) Para melhor conservação do frasco deve-se congelar a insulina.
- d) As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C.
- e) Após aberto, o frasco deve ser mantido somente em temperatura ambiente, e para minimizar dor no local da injeção deve estar entre 30°C e 45°C.

46

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) A escolha do posicionamento do paciente cirúrgico é essencial para assegurar a qualidade do processo e depende de diferentes fatores. Assinale a alternativa incorreta sobre essa escolha.

- a) Tipo de procedimento.
- b) Localização do sítio operatório.
- c) Preferência do paciente.
- d) Preferência do cirurgião.

47

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre o tempo cirúrgico, na etapa _____ o cirurgião rompe os tecidos para poder abordar uma região ou um órgão. Dependendo dos instrumentos utilizados, pode ser mecânica ou física.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Hemostasia.
- b) Diérese.
- c) Exérese.
- d) Operação propriamente dita.
- e) Síntese.

48

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Assinale a alternativa correta sobre qual via de administração de medicamentos tem a absorção lenta.

- a) Via sublingual.
- b) Via ocular.
- c) Via subcutânea.
- d) Via respiratória.

49

(TJ-MG/IBFC/2022) Consta na prescrição médica o banho de Permanganato de Potássio (KMnO_4) a 1:40.000, usando comprimidos de KMnO_4 de 50 mg. O enfermeiro precisará de _____ comprimido(s) de KMnO_4 de 50 mg para preparar dois litros da solução.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 1.
- b) 1,5.
- c) 1/2.
- d) 2.
- e) 2,5.

50

(SES-DF/IBFC/2022) A prescrição médica é solução de 1500 ml de Permanganato de Potássio (KMnO_4) a 1:20.000, usando comprimidos de KMnO_4 de 150 mg. O enfermeiro vai precisar de _____ comprimido(s) de KMnO_4 de 150 mg para preparar a solução.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 1,5.
- b) 1.
- c) $\frac{1}{2}$.
- d) 2.
- e) 2,5.

51

(SES-DF/IBFC/2022) Uma das doenças oculares é a Ceratocone, sendo uma enfermidade não inflamatória, que afeta a estrutura da (o) _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Cristalino.
- b) Conjuntiva.
- c) Íris.
- d) Nervo óptico.
- e) Córnea.

52

(SES-DF/IBFC/2022) A orelha (ouvido) é o órgão responsável pelo sentido da audição e também pelo nosso equilíbrio. Sobre esse assunto, analise as afirmativas.

I. A estrutura anatômica da orelha é complexa e se divide em orelha externa, média e interna.

II. É na orelha externa que se localiza o tímpano.

III. O tímpano é uma membrana fina que separa a orelha média e interna.

IV. Uma perfuração pequena do tímpano pode fechar em algumas semanas. Durante esse período, deve ser evitada a entrada de água na orelha, utilizando-se para isso, tampões especiais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV apenas.
- b) I, III e IV apenas.
- c) I e IV apenas.
- d) I apenas.
- e) I, II, III e IV.

53

(TJ-MG/IBFC/2022) Quanto à origem de uma ferida, ela é considerada _____ se o surgimento for previsível, de origem não traumática, apresentar um tempo maior para cicatrização, com maior risco para infecção e complicações.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) limpa.
- b) aguda.
- c) crônica.
- d) contaminada.
- e) infectada.

54

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Todo paciente deverá ser avaliado, sistematicamente, na admissão. No caso de um paciente adulto, sua

avaliação deve levar em consideração as fragilidades, vulnerabilidades e fatores de risco para o desenvolvimento de alterações de pele. Devem ser utilizadas escalas preditivas, com elevado grau de confiabilidade e especificidade. A avaliação do risco para desenvolvimento de Ulcera Por Pressão (UPP) deverá ser executada através de uma escala.

Assinale a alternativa correta sobre esta escala.

- a) Escala de Braden Q.
- b) Escala de Morse.
- c) Escala de Braden.
- d) Escala de RASS.

55

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Paciente internado há 4 dias e devido sua falta de mobilidade, encontra-se apresentando em região sacra uma perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial com leito vermelho sem esfacelo, flictena aberta, preenchida por líquido sero-hemático e com uma úlcera brilhante. Assinale a alternativa que apresenta, segundo classificação da UPP (Ulcera por pressão), qual estágio de classificação de lesão a mesma se encontra.

- a) Estágio I.
- b) Estágio II.
- c) Estágio III.
- d) Estágio não classificável.

56

(TJ-MG/IBFC/2022) A abstinência de substâncias caracteriza-se por uma alteração física e comportamental, com prejuízo cognitivo e fisiológico. Uma das mais discutidas, por sua condição clínica de gravidade, é a síndrome de abstinência alcoólica. Sobre os critérios diagnósticos para Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA), analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Desenvolvimento de uma síndrome específica devido à cessação ou redução do uso de uma determinada substância, após uso pesado ou prolongado.

() Desenvolvimento de síndrome reversível específica a droga usada, causada pela recente ingestão ou exposição.

() Síndrome específica da substância que causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas importantes de funcionamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V.
- b) V - F - V.
- c) F - V - F.
- d) F - F - F.
- e) V - F - F.

57

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre os critérios diagnósticos para síndrome de dependência química, analise as afirmativas abaixo.

I. Evidência de tolerância definida por necessidade de quantidades cada vez menores da substância para obter intoxicação ou efeitos desejados.

II. Evidência de tolerância definida por aumento acentuado do efeito com o uso continuado da mesma quantidade da substância.

III. Abandono ou redução de atividades sociais, ocupacionais ou recreativas em razão do uso da substância.

IV. Desejo persistente ou esforços infrutíferos para reduzir ou controlar o uso da substância.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II, III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

58

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre Bulimia Nervosa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Transtorno caracterizado por ingestão comedida de alimentos.

() Habitualmente se inicia com uma dieta para perda de peso em consequência de extrema insatisfação com o corpo.

() A ameaça de ganhar peso após a ingestão alimentar ocasiona um comportamento de prática vigorosa de exercícios físicos, adoção de jejuns ou métodos purgativos.

() O distúrbio ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F.
- b) V - V - V - V.
- c) F - V - V - F.
- d) F - F - V - F.
- e) V - V - V - F.

59

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Ao Técnico de Enfermagem cabe, especialmente, exercer atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.

() Participar da programação da assistência de enfermagem.

() Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

() Classificação de Risco.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V.
- b) F - F - V - V.
- c) V - F - F - F.
- d) V - V - V - F.

60

(SES-DF/IBFC/2022) De acordo com a Lei nº 7.498, 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, assinale a alternativa que não é atividade privativa do Enfermeiro.

- a) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- b) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigam

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

c) Consulta de enfermagem.

d) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.

e) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

61

(TJ-MG/IBFC/2022) Considerando a ética e atuação do profissional da enfermagem quanto às responsabilidades, deveres e direitos dos profissionais, assinale a alternativa incorreta.

a) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.

b) Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.

c) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.

d) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.

e) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.

62

(TJ-MG/IBFC/2022) A eutanásia é um tema muito polêmico e amplamente discutido no Brasil, sendo que o profissional da enfermagem é diretamente ligado a situações que envolvam sofrimento do paciente fase terminal e o pedido da eutanásia. Um paciente ou seu familiar pode solicitar a interrupção da vida para encerrar o ciclo de sofrimento a um profissional da enfermagem e este deve se posicionar corretamente diante de tal pedido. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) O profissional da enfermagem pode realizar o procedimento da eutanásia, desde que tenha o consentimento do (a) paciente ou da família, caso em que será documentado por escrito.
- b) Ao profissional da enfermagem é proibido promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do paciente.
- c) Somente será possível a realização da eutanásia pelo profissional da enfermagem, desde que autorizado por médico responsável pelo (a) paciente e autorizado pela instituição de saúde onde está sendo tratado.
- d) Será autorizado o profissional da enfermagem realizar a eutanásia, desde que tenha determinação administrativa, inclusive chancelada pela comissão de segurança do paciente da instituição de saúde onde o (a) paciente encontra-se em tratamento.
- e) Com a questão do cuidado com o (a) paciente, voltado à conduta adequada do profissional da enfermagem, será possível a eutanásia desde que possua parecer da equipe de psicologia da instituição de saúde onde está sendo tratado ou um profissional psicólogo independente que realize o parecer por escrito.

63

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) Incidentes Relacionados a Medicamentos (IRM) estão entre os mais comuns nos serviços de saúde. Estes podem acarretar prejuízos ao paciente e familiares nos aspectos da saúde física, mental e social, comprometer a imagem e a confiabilidade da instituição e, ainda, implicar os profissionais em processos e ações ético-moral-legais. Os profissionais de Enfermagem devem saber sobre requisitos de conhecimentos. Assinale a alternativa incorreta sobre o exposto.

a) Que o uso de medicamentos está associado a riscos.

b) Que existem fontes incomuns de erros.

c) Das suas responsabilidades, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

d) Que o domínio de cálculos e diluição de medicamentos é imprescindível para seu uso seguro.

64

(SES-DF/IBFC/2022) A Bioética surgiu no final da década de 60, e trata-se de uma disciplina filosófica que conecta a ciência, a vida e a moralidade. De acordo com os princípios da bioética, o princípio que nos leva a buscar maximizar o benefício e minimizar o risco e/ou o dano ao paciente é correto afirmar que se denomina _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Princípio da Beneficência.
- b) Princípio da Autonomia.
- c) Princípio da Justiça.
- d) Princípio da Equidade.
- e) Princípio da Maleficência.

65

(SES-DF/IBFC/2022) O Planejamento Estratégico Situacional é um método que trabalha no processamento de problemas atuais, problemas potenciais (ameaças e oportunidades) e macroproblemas. Considerando o triângulo de governo, a (o) _____ refere-se ao quanto de controle o ator tem sobre a situação que pretende governar.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) capacidade de governar.
- b) governabilidade.
- c) projeto de governo.
- d) estratégia.
- e) assertividade.

66

(TJ-MG/IBFC/2022) O Planejamento Estratégico Situacional (PES) no campo das políticas públicas surge, a partir da rejeição da ideia de racionalidade econômica para solucionar as questões políticas e sociais. Ademais, valoriza-se o reconhecimento da pluralidade de atores sociais envolvidos em uma realidade complexa e dinâmica. O PES é o método que trabalha no processamento de problemas atuais, problemas potenciais e macroproblemas. O momento do PES que consiste na implementação das ações

propostas, quando é necessário fazer a mediação do plano na realidade, é denominado _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) analítico.
- b) tático-operacional.
- c) explicativo.
- d) normativo.
- e) situacional.

67

(TJ-MG/IBFC/2022) O dimensionamento de pessoal de enfermagem é definido como uma etapa inicial do processo de provimento de pessoal, que tem como finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categoria requerida para suprir as necessidades de assistência direta ou indiretamente prestada aos pacientes. Considerando a Resolução do Cofen nº 543/2017, quanto ao quantitativo de profissionais estabelecido para provimento de pessoal, deverá ser acrescido o índice de segurança técnica (IST) de _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) no máximo 10% do total, dos quais 5% são referentes a férias e 5% a ausências não previstas.
- b) no mínimo 30% do total, dos quais 15% são referentes a férias e 15% a ausências não previstas.
- c) no máximo 50% do total, dos quais 25% são referentes a férias e 25% a ausências não previstas.
- d) no mínimo 15% do total, dos quais 8,3% são referentes a férias e 6,7% a ausências não previstas.
- e) no mínimo 25% do total, dos quais 5% são referentes a férias e 20% a ausências não previstas.

68

(TJ-MG/IBFC/2022) Os instrumentos administrativos constituem documentos importantes para direcionamento das atividades dos serviços de saúde. Considerando os diferentes tipos de instrumentos

administrativos, o documento que explica o planejamento do trabalho repetitivo e tem como objetivo padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução da atividade é denominado:

- a) Instrução Normativa.
- b) Regimento.
- c) Procedimento Operacional Padrão (POP).
- d) Registro de Enfermagem.
- e) Protocolo.

69

(TJ-MG/IBFC/2022) Os serviços de saúde têm buscado adaptar-se a novos cenários a incorporação de estratégias capazes de atender o usuário com maior qualidade na assistência à saúde. Neste sentido, a avaliação nos serviços de saúde vem sendo considerada como um processo de determinação da extensão, com a qual as metas e os objetivos estão sendo alcançados e, de como esse processo técnico-administrativo fornece subsídios para uma tomada de decisão. Considerando a Organização Nacional de Acreditação (ONA), o processo de Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde.

A instituição que cumprir ou superar, em 80% (oitenta por cento) os critérios de qualidade e segurança, além de cumprir os superar, em 70% (setenta por cento) ou mais os padrões ONA de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluída e plena comunicação entre as atividades, é correto afirmar que recebe a certificação:

- a) ONA nível 3 Acreditado com Excelência.
- b) ONA nível 10 Acreditado com Excelência.
- c) ONA nível 1 Acreditado.
- d) ONA nível 5 Acreditado com Excelência.
- e) ONA nível 2 Acreditado Pleno.

70

(SES-DF/IBFC/2022) No Brasil, o Ministério da Saúde em 1998 instituiu o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, dando origem à criação da Organização Nacional de Acreditação

(ONA) em 1999. Considerando o processo de acreditação, analise as afirmativas.

I. Surgiu para contribuir para avaliação da qualidade e garantir aos usuários e trabalhadores a segurança nos serviços de saúde.

II. É uma atividade compulsória, que pressupõe um alto investimento da instituição com finalidade de obtenção padrão de qualidade com referência externa.

III. Tem finalidade de fiscalização do exercício de profissionais que atuam na assistência.

IV. É um processo exclusivo para hospitais públicos e privados.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) I e II apenas.
- c) IV apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) II apenas.

71

(SES-DF/IBFC/2022) A educação na saúde consiste na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde e possui modalidades, sendo uma delas a (o) _____ que se configura como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho; e se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais e acontece no cotidiano do trabalho.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) educação continuada.
- b) educação baseada em evidência.
- c) treinamento.
- d) capacitação.
- e) educação permanente em saúde.

72

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) O acolhimento surgiu a partir das discussões sobre a reorientação da atenção à saúde, sendo elemento fundamental para a reorganização da assistência em diversos serviços de saúde,

direcionando a modificação do modelo tecno-assistencial. Em relação ao acolhimento ao usuário, assinale a alternativa incorreta.

- a) Escuta qualificada não é fator primordial.
- b) Facilitador da continuidade de redefinição dos projetos terapêuticos dos usuários.
- c) Inclusão do usuário e arranjos organizacionais.
- d) Prática presente em todas as relações de cuidado.

73

(SES-DF/IBFC/2022) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- a) Entre os epitélios escamoso e colunar, encontra-se a junção escamocolunar (JEC), que é uma linha encontrada apenas na endocérvice.
- b) O colo do útero apresenta uma parte interna, que constitui a chamada ectocérvice, que é revestida por uma única camada de células planas – epitélio escamoso.
- c) O colo do útero apresenta uma parte interna, que constitui o chamado canal cervical ou endocérvice, que é revestido por uma camada única de células cilíndricas produtoras de muco – epitélio colunar simples.
- d) Na infância e no período pós-menopausa, geralmente, a junção escamocolunar (JEC) situa-se no nível do orifício externo ou para fora desse – ectopia ou eversão.
- e) No período da menacme, fase reprodutiva da mulher, geralmente, a junção escamocolunar (JEC) situa-se dentro do canal cervical.

74

(SES-DF/IBFC/2022) Assinale a alternativa que contenha exemplo de forma de exposição materna ao sangue fetal do tipo traumática.

- a) Momento do parto.
- b) Cordocentese.
- c) Abortamento espontâneo.
- d) Mola hidatiforme.
- e) Gestação ectópica.

75

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre aleitamento materno, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Mamas ingurgitadas acontecem, habitualmente, na maioria das mulheres, do terceiro ao quinto dia após o parto. As mamas ingurgitadas são dolorosas, edemaciadas (com pele brilhante) e, às vezes, avermelhadas.

() Para evitar ingurgitamento, a pega e a posição para a amamentação devem estar adequadas e, quando houver produção de leite superior à demanda, as mamas devem ser ordenhadas manualmente.

() Os hábitos de manter as mamas umidificadas, e usar sabonetes cremosos, cremes ou pomadas também ajudam na prevenção das fissuras.

() Habitualmente, as fissuras ocorrem quando a amamentação é praticada com o bebê posicionado errado ou quando a pega está incorreta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V. d) V - F - V - F.
 b) V - V - F - V. e) F - F - V - V.
 c) F - V - F - V.

76

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a importância do Boletim de Apgar no recém-nascido (RN), analise as afirmativas abaixo.

I. O Boletim de Apgar deve ser usado para indicar o início da reanimação.

II. O Boletim de Apgar é útil para avaliar a resposta do RN às manobras de reanimação no 1º e 5º minutos de vida e, se necessário, no 10º, 15º e 20º minutos.

III. O Boletim de Apgar serve como um relatório numérico e muito prático para descrever a condição de nascimento e a recuperação do RN, quando reanimado.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas.
 b) II apenas.
 c) III apenas.
 d) I e III apenas.
 e) II e III apenas.

77

(Prefeitura de Contagem-MG/IBFC/2022) VACINA BCG (Bacillus De Calmette-Guérin) tem

em sua composição bacilos vivos, a partir de cepas do Mycobacterium bovis atenuadas sua indicação é a prevenção de formas graves de tuberculose (miliar e meníngea). Em relação a contra indicação da aplicação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Imunodeficiência congênita ou adquirida.

() Neoplasia maligna.

() Tratamento com corticoide em dose imunossupressora, quimioterapia ou radioterapia.

() Peso maior que 2000 quilos.

() Gravidez.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - F - V
 b) V - V - V - F - F
 c) V - V - F - V - V
 d) V - F - V - F - V

78

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a vacina Hepatite B (recombinante) em pessoas a partir de 7 (sete) anos de idade, assinale a alternativa correta.

a) Com comprovação vacinal de 3 (três) doses da vacina hepatite B, após 10 anos da terceira dose, deve-se administrar mais dois reforços com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose de reforço.

b) Com esquema vacinal incompleto e ou atrasado, deve-se reiniciar o esquema, e não apenas completá-lo.

c) Não está indicada a vacina da Hepatite B (recombinante) para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional.

d) Sem comprovação vacinal deve-se administrar 3 (três) doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 6 (seis) meses entre a primeira e a terceira dose (0, 1 e 6 meses).

e) Sem comprovação vacinal deve-se administrar 4 (quatro) doses da vacina hepatite B com intervalo de 45 dias entre a primeira e a segunda dose, de 6 (seis) meses entre a primeira e a terceira dose, e 1 (um) ano entre a primeira e quarta dose.

79

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (DTP), analise as afirmativas.

I. Administrar 2 (dois) reforços, o primeiro aos 15 meses de idade e o segundo aos 4 (quatro) anos de idade.

II. A vacina DTP é contraindicada para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade.

III. Na indisponibilidade da vacina DTP, como reforço administrar a vacina penta.

IV. O volume da dose é 0,3 ml, por via subcutânea.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV apenas.
- b) I apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, II, III e IV.

80

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a vacina da Poliomielite, assinale a alternativa correta.

a) A Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) é indicada para pessoas imunodeprimidas, contatos de pessoa HIV positiva ou com imunodeficiência.

b) O esquema da Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) é administrar apenas 2 (duas) doses aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.

c) O esquema da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) é administrar o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo aos 4 (quatro) anos de idade.

d) O volume da dose da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) são 2 gotas, exclusivamente por via oral.

e) O esquema da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) é administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias entre as doses.

81

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

() A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção Básica (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

() A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

() É proibida exclusão baseada apenas em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica e escolaridade, exceto quanto a nacionalidade do indivíduo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - V - F.
- b) V - V - V - V.
- c) V - F - V - F.
- d) V - V - V - F.
- e) F - V - V - V.

82

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre as Diretrizes da Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Regionalização e Hierarquização: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em

saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

() Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida independente e plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado.

() Participação da comunidade: estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.

() Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das pessoas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F.
- b) F - V - V - V.
- c) V - V - V - V.
- d) V - F - F - F.
- e) F - V - V - F.

83

(SES-DF/IBFC/2022) Sobre as diretrizes para a telessaúde no Brasil no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo.

I. Maior satisfação do usuário, maior qualidade do cuidado e menor custo para o SUS.

II. Atender aos princípios básicos de qualidade dos cuidados de saúde: segura, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e centrada no paciente.

III. Ampliar filas de espera e tempo para atendimentos ou diagnósticos especializados.

IV. Evitar os deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV apenas.
- b) I apenas.
- c) II, III e IV apenas.
- d) II e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

A COLEÇÃO MAIS COMPLETA DO BRASIL

