

Mentoria EBSE RH/IBFC

Prova Comentada da Prefeitura de Cuiabá-MT/2023 Dia 02/10/2023 (segunda-feira), às 20h

- 1**
(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A Hanseníase _____ é considerada a forma inicial da doença, pode evoluir espontaneamente para a cura ou para as formas polarizadas em aproximadamente 25% dos casos, o que costuma ocorrer no prazo de três a cinco anos. Geralmente, encontra-se apenas uma lesão, de cor mais clara que a pele normal, com distúrbio da sensibilidade, ou áreas circunscritas de pele com aspecto normal e com distúrbio de sensibilidade, podendo ser acompanhadas de alopecia e/ou anidrose. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- a) Dimorfa.
 - b) Tuberculóide.
 - c) Indeterminada.
 - d) Bordeline.
- 2**
(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) O tratamento da Tuberculose (TB) sensível deve ser realizado em regime ambulatorial, preferencialmente na Atenção Primária a Saúde. O esquema de tratamento de adultos e adolescentes para TB sensível compreende duas fases: a intensiva (ou de ataque) e a de manutenção. Na fase da manutenção, são utilizadas duas medicações: _____ e _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
- a) Pirazinamida / Rifampicina.
 - b) Pirazinamida / Etambutol.
 - c) Etambutol / Isoniazida.
 - d) Rifampicina / Isoniazida.
- 3**
(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar um amplo espectro clínico, variando de casos assintomáticos a graves. Na _____ da dengue, os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem nessa etapa. A maioria deles é resultante do aumento da permeabilidade capilar. Essa condição marca o início da piora clínica do paciente e sua possível evolução para o choque, por extravasamento plasmático. Sem a identificação e o correto manejo nessa fase, alguns pacientes podem evoluir para as formas graves. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- a) fase crítica.

- b) fase febril.
- c) fase recuperação.
- d) fase da cura.

4

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre os sinais de alarme da Dengue, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua.
- () Redução no tamanho do fígado, à quase a metade de seu tamanho normal.
- () Sangramento de mucosa.
- () Diminuição do hematócrito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - F - V.
- b) F - F - V - V.
- c) V - F - V - F.
- d) V - V - F - F.

5

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre a Rubéola, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Doença exantemática aguda, de etiologia bacteriana, que apresenta baixa contagiosidade.
- () Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e a síndrome da rubéola congênita.
- () O reservatório considerado é o humano.
- () O modo de transmissão ocorre por meio de contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - F.
- b) F - V - V - V.
- c) V - F - V - F.
- d) F - V - F - F.

6

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre as doenças Varicela e Herpes-Zóster, analise as afirmativas a seguir.

I. O Herpes-Zóster decorre da reativação do vírus da varicela, que permanece em latência no

sistema nervoso após a infecção primária. A reativação ocorre na idade adulta, e é mais comum em pessoas imunocomprometidas.

II. A principal característica clínica no HerpesZóster é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido.

III. A Varicela é uma infecção viral primária febril, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto maculopapular e distribuição centrípeta, que, após algumas horas, torna-se vesicular, evolui rapidamente para pústulas e, posteriormente, forma crostas secas não infecciosas, em três a sete dias.

IV. A varicela é caracterizada por manifestações cutâneas dolorosas. O quadro clínico manifesta-se desde a forma benigna até formas graves.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II e IV apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I, II, III e IV.

7

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre as características gerais da Coqueluche, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O ser humano é o único reservatório natural.
- () Os portadores crônicos e os casos oligossintomáticos, apresentam uma grande importância na disseminação da doença.
- () Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca.
- () Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - V - F.
- b) V - V - V - F.
- c) F - F - V - V.
- d) V - F - V - V.

8

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Queixas de diarreias produzidas pela ingestão de toxinas alimentares como a Staphylococcus aureus, são

bastante comuns em pacientes nas unidades de pronto socorro. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A bactéria multiplica-se em alimentos ricos em proteínas, principalmente maionese, ovos, presuntos e saladas, e produz a toxina em algumas horas, antes de o indivíduo ingerir a comida.

() As toxinas causam mudança no sabor, no cheiro ou na aparência dos alimentos pois não são termoestáveis.

() O quadro clínico inicia-se de uma a seis horas após a ingestão do alimento. Surgem vômitos intensos, dor abdominal em cólica, sem febre, com ou sem diarreia.

() O tratamento é feito com antieméticos e reposição hidroeletrólítica, quando indicado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V.
- b) V - F - V - V.
- c) F - V - F - V.
- d) V - F - F - V.

9

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) O laboratório desempenha um papel muito importante na vigilância do sarampo a medida que aumenta o nível de controle da doença. Geralmente, a _____ ocorre na fase aguda da doença, desde os primeiros dias até 30 dias após o aparecimento do exantema. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Detecção de anticorpos IgM.
- b) Detecção de anticorpos IgG.
- c) Detecção viral.
- d) Detecção de anticorpos IgV.

10

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. A _____ é transmitida pela via fecal-oral, está relacionada às condições de saneamento básico, e apresenta período de

incubação de 15 a 45 dias (média de 30 dias). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Hepatite B.
- b) Hepatite A.
- c) Hepatite C.
- d) Hepatite D.

11

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Considerando que normalmente a pele humana é habitada por bactérias, é preciso que o instrumentador, assim como os demais integrantes da equipe cirúrgica, antes de vestir o avental esterilizado e calçar as luvas, realize a degermação das mãos e dos antebraços. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir.

I. Deve-se realizar escovação demorada e usar escova com cerdas duras, com os movimentos repetitivos de vaivém exigidos pela técnica.

II. Ao finalizar o processo de degermação, o instrumentador deve dirigir-se à sala de operação com as mãos e os antebraços na posição vertical e tendo o cuidado de não tocar em nenhum objeto, para não comprometer a degermação realizada.

III. Uma vez na sala, o instrumentador realiza a secagem das mãos e de parte dos antebraços com uma compressa esterilizada. O movimento tem início nos cotovelos e continua em direção às mãos, com movimentos de esfregação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas.
- b) II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

12

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A _____ é caracterizada pelo período em que não se observam sinais ou sintomas. O diagnóstico faz-se exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Sífilis primária.

- b) Sífilis latente.
- c) Sífilis secundária.
- d) Sífilis terciária.

13

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre a Síndrome do Corrimento Uretral, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() O período de incubação da gonorreia urogenital varia de dois a cinco dias, variando de um a dez dias. Para a clamídia, esse período é maior, de 14 a 21 dias.

() Durante o sexo vaginal, as taxas de transmissão de homens para mulheres são maiores do que de mulheres para homens.

() A suscetibilidade à infecção não é universal e os anticorpos produzidos em infecções anteriores são protetores. Portanto, o indivíduo não vai adquirir a doença se exposto novamente.

() As mulheres infectadas por *N. gonorrhoeae* podem transmitir ao concepto durante o parto vaginal, mas não durante a gravidez. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - V.
- b) V - V - V - V.
- c) V - V - F - V.
- d) F - F - V - F.

14

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A Norma Regulamentadora 16 (NR 16) sobre as Atividades e Operações Perigosas, refere que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de _____, incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 50% (cinquenta por cento).
- b) 20% (vinte por cento).
- c) 40% (quarenta por cento).
- d) 30% (trinta por cento).

15

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) O sistema de climatização da sala de desinfecção química deve atender além do disposto nas normatizações pertinentes, ou seja, deve atender outros itens importantes. Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m².

() Manter um diferencial de pressão positivo entre os ambientes adjacentes.

() Prover exaustão forçada de todo ar da sala com descarga para o exterior da edificação.

() O ar de reposição pode ser proveniente dos ambientes vizinhos, inclusive da área suja.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V.
- b) V - F - V - F.
- c) F - V - F - V.
- d) F - V - V - F.

16

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A definição dos artigos hospitalares varia de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções. _____ é considerado(a) um exemplo de artigo crítico. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Vidraria para aspiração.
- b) Inaladores.
- c) Máscaras de ambú.
- d) Cabo de Laringoscópio.

17

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Sobre a Norma Regulamentadora (NR) 26 - Sinalização de Segurança, analise as afirmativas a seguir.

I. A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes.

II. O uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador.

III. A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a segurança e saúde dos trabalhadores deve dispor de rotulagem preventiva simplificada que contenha, no mínimo, a indicação do nome.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II apenas.
- d) I, II e III.

18

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Entende-se como trabalho de teleatendimento/telemarketing aquele cuja comunicação com interlocutores clientes e usuários é realizada a distância, por intermédio da voz e/ou mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados. A Norma Regulamentadora nº 17 traz orientações sobre o trabalho em teleatendimento/telemarketing. Sobre os mobiliários deste posto de trabalho, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() O dispositivo de apontamento na tela (mouse) deve estar apoiado em uma superfície diferente da do teclado, colocado em área de fácil alcance mas, com espaço reduzido para sua movimentação.

() As superfícies de trabalho devem ser reguláveis em altura em um intervalo mínimo de 13 cm (treze centímetros), medidos de sua face superior, permitindo o apoio das plantas dos pés no piso.

() Nos casos em que os pés do operador não alcancem o piso, mesmo após a regulagem do assento, deve ser fornecido apoio para os pés que se adapte ao comprimento das pernas do trabalhador, permitindo o apoio das plantas dos pés, com inclinação ajustável e superfície revestida de material antiderrapante.

() Os assentos devem ser dotados de apoio em 3 (três pés), sem rodízios cuja resistência facilite deslocamentos involuntários.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - F - V.
- b) V - V - V - V.
- c) V - F - V - F.
- d) F - V - V - F.

19

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A escolha do curativo é importante para um tratamento eficaz da ferida. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de lesão que se indica a Papaína.

- a) Lesão necrótica.
- b) Lesão isquêmica.
- c) Lesão com bastante exsudato e odor.
- d) Lesão infectada.

20

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) _____ é utilizado(a) no desbridamento químico. Promove a retirada do tecido necrótico superficial por ação enzimática, e acelera o crescimento do tecido de granulação. Assinale a alternativa que contenha o produto utilizado na lesão pouco exsudativa, com crosta, necrose e fibrina. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Colagenase a 10%.
- b) Alginato de Cálcio.
- c) Papaína a 1%.
- d) Ácido Graxo essencial.

21

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Assinale a alternativa que apresenta a finalidade da aplicação de calor sobre a pele do paciente.

- a) Facilitar os processos supurativos.
- b) Estancar o sangramento.
- c) Baixar a temperatura na hipertermia.
- d) Contração da musculatura.

22

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A deiscência pode trazer o aumento do período de internação e dos custos hospitalares e um grande impacto negativo no bem-estar do paciente, podendo levar a graves problemas de saúde se não tratada corretamente. Assinale a alternativa que apresenta a descrição da terminologia Deiscência.

- a) Separação de bordas previamente suturadas de uma ferida.
- b) Corte e separação de tecidos do corpo de forma desnecessária.
- c) Remoção de um tecido vivo para exame sem a quantidade adequada.
- d) Saída de vísceras de sua cavidade por erro do médico cirurgião.

23

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre o objetivo da vacinação de rotina, que é uma das estratégias do Programa Nacional de Imunização (PNI), assinale a alternativa correta.

- a) É captar e vacinar 100% da população-alvo.
- b) Alcançar altas coberturas vacinais em curto espaço de tempo.
- c) Interromper a transmissão de um agente infeccioso em zona de risco na presença de caso suspeito.
- d) Evitar a transmissão de um agente infeccioso em zona de risco na presença de caso confirmado.

24

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre as particularidades da vacina BCG, analise as afirmativas a seguir.

- I. A única comprovação da vacinação com BCG existente é a feita por meio da identificação da cicatriz vacinal.
- II. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal, necessitam ser revacinadas.
- III. Esta vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas. Estão corretas as afirmativas:
 - a) I e II apenas.

b) II e III apenas.

c) III apenas.

d) I, II e III.

25

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) O esquema da vacina contra _____ é administrar 1 (uma) dose ao nascer, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Esta dose pode ser administrada até 30 dias após o nascimento. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Hepatite B.
- b) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) – Pneumo 10v.
- c) Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) – VOP.
- d) Vacina rotavírus humano (atenuada) – VRH.

26

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre a vacina adsorvida Difteria, Tétano e Pertussis (acelular) tipo adulto – dTpa, assinale a alternativa correta.

- a) Profissionais da saúde com esquema de vacinação primário completo, deve-se administrar a vacina dTpa como reforço a cada dez anos em substituição da dT.
- b) O esquema para gestante é 2 (duas) doses a cada gestação, sendo a primeira apenas a partir da vigésima sétima semana de gestação.
- c) Profissionais da saúde com esquema de vacinação primário completo, a vacina dTpa está contraindicada como reforço a cada dez anos em substituição da dT.
- d) Para gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, não administrar a vacina de dTpa no puerpério pois neste período, esta vacina está contraindicada.

27

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre o reforço da vacina adsorvida Difteria e Tétano adulto – dT (Dupla Adulto), analise as afirmativas a seguir.

- I. Indivíduos a partir de 7 (sete) anos de idade, com esquema vacinal completo (3 doses) para

difteria e tétano, administrar 1 (uma) dose a cada 10 anos após a última dose.

II. Em todos os casos, após completar o esquema básico (DTP, tetra ou penta) e reforços, administrar reforço com a dT a cada 10 anos, após a última dose. III. Em casos de ferimentos graves e comunicantes de casos de difteria, antecipar a dose quando a última foi administrada há mais de 5 (cinco) anos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II apenas. c) I apenas.
b) I e II apenas. d) I, II e III.

28

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre a vacina Pneumocócica Polissacarídica 23-valente – Pneumo 23v, assinale a alternativa correta.

- a) O volume da dose é 0,3ml e via de administração é a via subcutânea.
b) Administrar 1 (uma) dose em todos os indígenas a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade com ou sem comprovação vacinal com as vacinas pneumocócicas conjugadas.
c) Administrar 1 (uma) dose a partir de 50 anos, em vacinados ou não que vivem acamados e/ou em instituições fechadas, como casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/asilos e casas de repouso.
d) É contraindicada para as crianças menores de 2 (dois) anos de idade.

29

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre as particularidades da vacina da Varicela (atenuada), analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Crianças não vacinadas oportunamente aos 4 (quatro) anos de idade, poderão ser vacinadas com até 6 (seis) anos 11 meses e 29 dias, incluindo as crianças indígenas nessa faixa etária.
() Indígenas a partir dos 7 (sete) anos de idade não vacinados ou sem comprovação vacinal, administrar 1 (uma) ou duas doses de vacina varicela (atenuada), a depender do laboratório produtor.
() Administrar uma dose de reforço até os 6 (seis) anos, 11 meses e 29 dias de idade.

Correspondente à terceira dose da vacina varicela, considerando a dose de tetra viral aos 15 meses e outra aos 4 anos de idade.

() Profissionais da saúde não vacinados e que trabalham na área assistencial, especialmente em contato com pessoas imunodeprimidas e os da área de pediatria devem receber uma ou duas doses de vacina varicela (atenuada), a depender do laboratório produtor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - V.
b) V - V - F - F.
c) F - F - V - F.
d) F - V - F - V.

30

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre a Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O esquema consiste em administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias entre as doses.
() Quanto ao volume da Dose e Via de Administração: duas gotas, exclusivamente por via oral.
() Realizar reforço aos 15 meses e o segundo aos 4 (quatro) anos de idade. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F.
b) V - V - V.
c) F - V - V.
d) F - V - F.

31

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre a vacinação simultânea com vacina febre amarela (atenuada), analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Crianças menores de 2 (dois) anos de idade que nunca foram vacinadas com as vacinas febre amarela e tríplice viral ou tetra viral: Não administrar simultaneamente as vacinas febre amarela e tríplice viral (sarampo, caxumba e

rubéola) ou tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), devido à possibilidade da diminuição da resposta imune pela vacinação concomitante ou com intervalo inferior a 30 dias.

() Crianças menores de 2 (dois) anos de idade, vacinadas anteriormente com as vacinas tríplice viral ou tetraviral e não vacinada contra a febre amarela, poderá receber simultaneamente as vacinas tríplice viral ou tetraviral com a vacina febre amarela.

() Pessoas a partir de 2 anos (dois) de idade e adultos em qualquer idade: As vacinas febre amarela e tríplice viral ou tetraviral podem ser administradas simultaneamente. Porém, se não administradas simultaneamente, deve-se respeitar o intervalo de 30 dias entre as doses, mínimo de 15 dias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F.
- b) V - V - V.
- c) V - F - V.
- d) F - V - F.

32

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) O Telesaúde Brasil Redes oferta aos trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) alguns benefícios. O (A) _____ é uma resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Teleconsultoria.
- b) Segunda Opinião Formativa.
- c) Tele-educação.
- d) Diagnóstico de ponta.

33

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre as diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),

correlacione as colunas de cima para baixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- A. População Adscrita
- B. Resolutividade
- C. Longitudinalidade do cuidado
- D. Territorialização e Adstrição

() Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

() Permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele.

() População que está presente no território da unidade básica de saúde, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

() Reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

- a) B, A, D, C.
- b) D, C, B, A.
- c) A, B, C, D.
- d) C, D, A, B.

34

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) O Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, decorrente do modelo de

desenvolvimento comprometido com a produção de bens primários para exportação. Os agrotóxicos incluem um grande grupo de substâncias químicas utilizadas intensamente pelo setor agropecuário, tanto na produção e armazenamento de grãos e sementes (soja, café etc.), cana-de-açúcar, algodão, como também de flores, frutas, verduras e legumes. O reconhecimento da toxicidade de um produto, considerando os efeitos agudos, baseia-se na dose _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) segura 40 (DS 40).
- b) fatal 30 (DF 30).
- c) letal 50 (DL 50).
- d) mortal 25 (DM 25).

35

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) É atribuição do profissional da Saúde que atua na Atenção Básica orientar as mulheres com resultado de exame citopatológico normal a seguir a rotina de rastreamento. Sobre os achados de alterações celulares benignas (reativas ou reparativas), analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A Inflamação sem identificação de agente é caracterizada pela presença de alterações celulares epiteliais, geralmente determinadas pela ação de agentes físicos, os quais podem ser radioativos, mecânicos ou térmicos e químicos, como medicamentos abrasivos ou cáusticos, quimioterápicos e acidez vaginal sobre o epitélio glandular.

() Ocasionalmente, podem-se observar alterações, em decorrência do uso do dispositivo intrauterino (DIU), em células endometriais e endocervicais.

() O Papanicolaou apresenta evidentes limitações no estudo microbiológico, de forma que algumas alterações podem se dever a patógeno não identificado. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - F.
- b) V - V - V.
- c) V - F - V.

d) V - V - F.

36

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre o método anticoncepcional a ser utilizado durante a fase do aleitamento materno, analise as afirmativas a seguir.

I. O DIU pode ser inserido imediatamente após o parto ou a partir de quatro semanas pós-parto.

II. Os métodos comportamentais – tabelinha, muco cervical, entre outros – poderão ser usados sempre, mesmo com ciclo menstrual irregular.

III. O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto.

IV. Para orientar o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto, deve-se considerar o tempo pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou não da menstruação e os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente.

Estão corretas as afirmativas:

- a) IV apenas.
- b) I e IV apenas.
- c) I, III e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.

37

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro precisa calcular a data provável do parto (DPP) da gestante, com data da última menstruação (DUM) em 13 de agosto de 2022. Faça o cálculo e assinale a alternativa correta.

- a) DPP em 20 de maio de 2023.
- b) DPP em 16 de abril de 2023.
- c) DPP em 06 de maio de 2023.
- d) DPP em 13 de maio de 2023.

38

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Um dos princípios da Bioética é a obrigação de não causar danos, de não prejudicar intencionalmente. E esse dano não fica restringido apenas aos aspectos físicos, como a dor, as incapacidades e a morte, mas inclui o âmbito psíquico, social e

moral. Assinale a alternativa que contemple o princípio da Bioética citado.

- a) Imperícia.
- b) Beneficência.
- c) Não maleficência.
- d) Negligência.

39

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A Bioética surge com o avanço das ciências biomédicas que trouxeram questões relacionadas com a vida. Dentre os modelos de análise em Bioética temos o (a) _____ que na defesa da liberdade confere centralidade ao direito do indivíduo dispor de seu corpo e decidir sobre sua vida. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) cuidado.
- b) casuística.
- c) liberalismo.
- d) principialista.

40

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Considerando o texto, assinale a alternativa que apresenta a fase do Processo de Enfermagem citado.

- a) Avaliação de Enfermagem.
- b) Diagnóstico de Enfermagem.
- c) Histórico de Enfermagem.
- d) Implementação.

41

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Os locais mais utilizados para verificação da temperatura corporal são cavidades oral e retal e região axilar. Em média, a temperatura oral considerada normal é a 37°C, e a temperatura axilar _____ e a retal _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 1,0°C mais baixa / 1,0°C mais baixa.
- b) 0,6°C mais baixa / 0,6°C mais alta.

- c) 0,8°C mais alta / 0,8°C mais alta.
- d) 0,5°C mais alta / 0,5°C mais baixa.

42

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A temperatura corporal reflete o equilíbrio entre a produção e a perda de calor de determinado organismo. O calor pode ser perdido por alguns mecanismos como _____ que é responsável pela perda de calor entre o organismo e o meio sem contato direto e é responsável por 50 a 70% da perda de calor de uma pessoa em repouso em um ambiente neutro (a 28°C). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Sublimação.
- b) Evaporação.
- c) Irradiação.
- d) Condução.

43

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A temperatura corporal reflete o equilíbrio entre a produção e a perda de calor de determinado organismo. O calor pode ser perdido por alguns mecanismos como _____ que é responsável pela perda de calor entre o organismo e o meio sem contato direto e é responsável por 50 a 70% da perda de calor de uma pessoa em repouso em um ambiente neutro (a 28°C). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Sublimação.
- b) Evaporação.
- c) Irradiação.
- d) Condução.

44

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) No Diabetes Mellitus, sobre os fatores adicionais que podem indicar a necessidade de maior frequência de consultas e o rastreamento de complicações em membros inferiores, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Presença de calos, calosidades nos pés, micoses (interdigital ou ungueal), unhas encravadas, deformidades nos pés e pododáctilos.

() Alto nível de conhecimento sobre cuidados preventivos.

() Condições de higiene adequadas.

() Residência em instituição de longa permanência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) F - V - F - V.

b) V - V - V - V.

c) V - F - F - F.

d) V - F - F - V.

45

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil está aumentando em todo o mundo, com reflexos em curto e longo prazos na saúde pública. Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir.

I. A aterosclerose e a hipertensão arterial são processos patológicos iniciados na infância e, entre os fatores de risco para doenças e agravos não transmissíveis, estão os hábitos alimentares desregrados e a falta de atividade física.

II. No desenvolvimento da criança, são considerados fatores de risco para a obesidade o sobrepeso ou obesidade dos pais.

III. A obesidade materna, mesmo antes da gestação, não se correlaciona ao índice de massa corpórea da criança em qualquer faixa etária.

IV. No desenvolvimento da criança, são considerados fatores de risco para a obesidade a inatividade física, indiretamente avaliada pelo número de horas em que a criança assiste à televisão. Deve ser encorajado que se reduza a 2 horas/dia o tempo com atividades sedentárias, como videogames, computador e televisão.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e IV apenas.

b) II, III e IV apenas.

c) II e IV apenas.

d) I, II, III e IV.

46

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Foi prescrita a posição Semi-Fowler para um portador de patologia respiratória. Assinale a

alternativa correta que contenha a descrição da posição solicitada ao Técnico de Enfermagem.

a) A partir do decúbito dorsal, elevar a cabeceira da cama em 45° sem flexão dos membros inferiores, que permanecem estendidos.

b) O paciente é colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo inclinado, de forma que a cabeça fique em nível mais baixo em relação ao corpo.

c) O paciente deve ficar de pé, com o peso distribuído igualmente nos membros inferiores, os pés ligeiramente afastados sobre chão forrado, quando descalço.

d) Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo com a cabeça apoiada no travesseiro.

47

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Considerando que a técnica na coleta de urina depende do tipo de exame solicitado, assinale a alternativa correta.

a) A cultura deve ser coletada pela manhã, na segunda micção do dia e não requer cuidados específicos.

b) O teste de gravidez requer cuidados específicos, orientar higiene previa dos genitais externos, desprezar o primeiro jato da urina e coletar o jato médio em recipiente limpo e seco.

c) Para proteinúria, clearance ou urina de 24 horas, estabelecer o horário de início e término da coleta, e orientar que em caso de perda de volume, não é necessário reiniciar o processo.

d) Para glicosúria e cetonúria, quando realizada na unidade, verificar logo após a micção, imergir a fita reagente na urina e comparar com o padrão definido no rótulo do frasco, no tempo estipulado pelo fabricante.

48

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A anosmia pode ser um problema por si só ou um sintoma de outra complicação na saúde, podendo ser permanente ou temporário. Assinale a alternativa que contenha a definição de Anosmia.

a) Ausência de olfato.

b) Processo inflamatório com secreção nasal.

- c) Perda de audição.
- d) Ausência ou diminuição da voz.

49

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Em uma unidade de saúde foi prescrito pelo médico Penicilina Cristalina 3.500.000 UI para administração endovenosa, diluída em Soro Fisiológico 0,9% de 250 ml, para correr em 2 horas. Temos disponível frascos ampolas de Penicilina Cristalina 5.000.000 UI e Soro Fisiológico 0,9% de 250 ml. Faça o cálculo e assinale a alternativa correta que contenha a quantidade em ml que será aspirada do frasco ampola da Penicilina Cristalina 5.000.000 UI para o preparo da prescrição e quantidade de gotas por minuto para correr o soro no prazo estipulado.

- a) 7 ml; 125 gotas por minuto.
- b) 7 ml; 43 gotas por minuto.
- c) 5 ml; 42 gotas por minuto.
- d) 3,5 ml; 83 gotas por minuto.

50

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A prescrição médica é Penicilina Cristalina 2.400.000 UI para administração endovenosa, diluída em Soro Fisiológico 0,9% de 100 ml, para correr em 1 hora. Temos disponível frascos ampolas de Penicilina Cristalina 5.000.000 UI e Soro Fisiológico 0,9% de 100 ml. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade em ml que será aspirada do frasco ampola da Penicilina Cristalina 5.000.000 UI para o preparo da prescrição e quantidade de gotas por minuto para correr o soro no prazo estipulado.

- a) 2,5 ml; 33 gotas por minuto.
- b) 4,8 ml; 35 gotas por minuto.
- c) 2,4 ml; 17 gotas por minuto.
- d) 3,2 ml; 17 gotas por minuto.

51

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Foi prescrito banho de Permanganato de Potássio (KMnO_4) a 1:30.000, usando comprimidos de KMnO_4 de 200 mg. O Técnico de Enfermagem vai precisar de _____ comprimido(s) de KMnO_4 de

200mg para preparar seis litros da solução. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 2.
- b) 0,5.
- c) 1,5.
- d) 1.

52

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Em uma unidade de internação foi prescrito pelo médico uma solução de Permanganato de Potássio (KMnO_4) a 1:20.000, usando comprimidos de KMnO_4 de 100mg. O enfermeiro vai precisar de _____ comprimido(s) de KMnO_4 de 100mg para preparar cinco litros da solução. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 2,5.
- b) 2,0.
- c) 1,0.
- d) 1,5.

53

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A inclusão do Índice de Massa Corporal (IMC) como parâmetro de avaliação permite que a criança seja mais bem avaliada na sua relação peso versus comprimento (para menores de 2 anos) ou peso versus altura (para maiores de 2 anos). Sobre IMC na criança, analise as afirmativas a seguir.

I. Auxilia na classificação de crianças que em um determinado período estiveram desnutridas e tiveram o comprometimento de sua estatura, possibilitando uma melhor identificação de crianças com excesso de peso e baixa estatura.

II. O peso por idade mostra se a criança está com peso abaixo do recomendado para a sua idade, e também se a sua estatura já foi comprometida.

III. O IMC já foi validado em crianças como bom marcador de adiposidade e sobrepeso, apresentando estreita correlação com outros parâmetros que avaliam a porcentagem de gordura corpórea, como as pregas cutâneas, a densitometria e a bioimpedância eletromagnética.

IV. Recomenda-se o uso do IMC apenas a partir de 2 anos de idade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) I, III e IV apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I, II, III e IV.

54

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A Doença Hemolítica Perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves repercussões sobre a vitalidade do feto. É também conhecida como isoimunização (produção de anticorpos em resposta a antígenos provenientes de um ser da mesma espécie), a DHP tem como pré-requisito a transfusão de sangue com _____ para a mulher com _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Fator Rh negativo / Fator Rh negativo.
- b) Fator Rh positivo / Fator Rh negativo.
- c) Fator Rh positivo / Fator Rh positivo.
- d) Fator Rh negativo / Fator Rh positivo.

55

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), analise as afirmativas a seguir.

I. É caracterizada pela presença de desempenho inapropriado na atenção e na atividade, de início na infância, e marcado por desatenção, impulsividade e hiperatividade.

II. A fim de satisfazer os critérios diagnósticos, o transtorno deve estar presente por, pelo menos, 6 meses, comprometer o funcionamento acadêmico ou social e ocorrer antes dos 7 anos de idade.

III. É muito comum o indivíduo apresentar o mesmo nível de disfunção em todos os contextos ou dentro do mesmo contexto em todos os momentos. Os sintomas tipicamente melhoram em situações que exigem atenção ou esforço mental constante.

IV. No ambiente escolar, as crianças iniciam rapidamente um teste, mas respondem apenas às primeiras questões, frequentemente são irritáveis e instáveis emocionalmente.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV.
- b) I e II apenas.
- c) I apenas.
- d) I, II e IV apenas.

56

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Quanto à anorexia nervosa, assinale a alternativa correta.

a) A Anorexia Nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por uma busca deliberada e inexorável da magreza, por meio de intensa restrição alimentar, comportamentos voltados ao controle do peso e comportamentos purgativos, com manutenção do peso corporal abaixo do mínimo adequado para a idade e altura.

b) Na Anorexia Nervosa, o estado de desnutrição é acompanhado de distúrbios endócrinos que ocasionam grandes volumes menstruais nas portadoras, levando a uma anemia profunda, mas não há distorção da imagem corporal.

c) A Anorexia Nervosa do tipo purgativo é a perda de peso ocasionada pela ingestão ilimitada de alimento.

d) A Anorexia Nervosa do tipo restritivo é a ganho de peso mesmo sendo induzido por vômitos.

57

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) A alimentação e a hidratação interferem diretamente no desenvolvimento e no crescimento do indivíduo e na capacidade de trabalhos físico e intelectual. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

a) O organismo humano é capaz de armazenar maior quantidade de vitaminas hidrossolúveis do que lipossolúveis.

b) Aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo é incapaz de sintetizar, devem ser fornecidos por meio de outras fontes.

c) Proteínas são nutrientes essenciais na formação de enzimas, hormônios e células, indispensáveis no processo de crescimento e regeneração dos tecidos.

d) A vitamina D interfere no metabolismo dos carboidratos, e a carência pode desencadear a beribéri.

58

(Prefeitura de Cuiabá-MT/IBFC/2023) Sobre a atuação do circulante, durante a indução anestésica, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Apoiar o braço do paciente no suporte acolchoado, mesmo que não haja utilização de soro, tendo o cuidado de manter um ângulo superior a 90° com o corpo, para prevenir desconfortos no pós-operatório.

() Fornecer ao anestesiolista os materiais e medicamentos que ele necessitar.

() Ajudar o anestesiolista a observar alterações que o paciente possa apresentar no decorrer da anestesia, como mudança na coloração da pele e da mucosa e sudorese, prevenindo assim complicações.

() Controlar o gotejamento de soro e demais infusões venosas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V - V - V - F.

b) F - V - V - F.

c) F - V - V - V.

d) V - V - V - V.

A COLEÇÃO MAIS COMPLETA DO BRASIL

