

MENTORIA EBSE RH/IBFC SESACRE/IBFC/2022

Aula nesta quarta-feira, 18/10, às 20h.
82 questões comentadas

1
(SESACRE/IBFC/2022) O diabetes mellitus, comumente designado como diabetes, abrange um grupo de doenças metabólicas, caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia), devido a defeitos na secreção ou na ação da insulina ou em ambas. Sobre o diabetes mellitus tipo 2, assinale a alternativa correta.

- a) Caracteriza-se pela destruição das células beta do pâncreas, devido a fatores genéticos, imunológicos e, possivelmente ambientais. São necessárias injeções de insulina para controlar os níveis de glicemia.
- b) O tratamento consiste na adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, moderação no uso de álcool e abandono do tabagismo, acrescido ou não do tratamento farmacológico.
- c) A cetoacidose diabética (CAD) é mais comum em indivíduos com diabetes tipo 2.
- d) O diabetes tipo 2 tem início súbito, geralmente antes dos 30 anos de idade.

2
(SESACRE/IBFC/2022) O Pé diabético é uma das complicações mais devastadoras do Diabetes Mellitus, sendo responsável por 50-70% das amputações não traumáticas. Se durante a assistência a um paciente diabético observarmos a presença de pele seca, diminuição da sudorese e veias dilatadas poderemos prever maior risco de desenvolver úlceras, devido a um possível

quadro de _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) polineuropatia diabética sensitivo-motora.
- b) neuropatia diabética autonômica.
- c) doença arterial periférica.
- d) osteomielite.

3
(SESACRE/IBFC/2022) Há evidências consistentes de que a avaliação e o acompanhamento das pessoas com Diabetes Mellitus com atenção voltada para lesões nos pés reduzem as taxas de amputações. Analise as afirmativas a seguir sobre autocuidado no pé diabético.

I. Realize a inspeção diária dos pés (seja por você mesmo ou com a ajuda de um familiar ou um cuidador orientado), incluindo as áreas entre os dedos .

II. Use, sempre que possível, meias com costura de dentro para fora ou, de preferência, sem costura .

III. Use calçados confortáveis e de tamanho apropriado, evitando o uso de sapatos apertados ou com reentrâncias e costuras irregulares.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I, II e III.

4
(SESACRE/IBFC/2022) Assinale a alternativa que não apresenta qual é a consequência usual que a hipertensão descontrolada prolongada pode ocasionar.

- a) Infarto do miocárdio.
- b) Acidentes vasculares cerebrais.

- c) Insuficiência cardíaca e renal.
- d) Hipotireoidismo.

5

(SESACRE/IBFC/2022) Assinale a alternativa que contemple uma assistência de enfermagem correta para um paciente que apresenta hipertermia.

- a) Aquecer o paciente com agasalhos e cobertores.
- b) Aumentar a ingesta líquida e repouso.
- c) Manter o ambiente aquecido.
- d) Ingestão de alimentos quentes.

6

(SESACRE/IBFC/2022) Ao realizar a aferição dos sinais vitais de um paciente adulto da clínica médica, os dados vitais evidenciados foram: temperatura 35°C, pulso 55 batimentos/minuto e pressão arterial 60/40 mmHg (milímetros de mercúrio). Ao avaliar esses dados podemos dizer que o paciente está:

- a) afebril, bradicárdico e hipotenso.
- b) hipotérmico, bradicárdico e hipotenso.
- c) afebril, bradicárdico e hipertenso.
- d) hipertérmico, bradicárdico e hipotenso.

7

(SESACRE/IBFC/2022) Ao verificar a frequência cardíaca de uma pessoa adulta jovem na avaliação dos sinais vitais, o resultado foi de 102 batimentos por minuto, pulso cheio, forte e rítmico. De acordo com o exposto podemos dizer que estamos diante de um quadro de _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Bradicardia ou bradisfigmia.
- b) Taquicardia ou taquisfigmia.
- c) Pulso irregular.
- d) Pulso dicrótico.

8

(SESACRE/IBFC/2022) A _____ é quando a respiração é facilitada na posição vertical. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Respiração laboriosa.

- b) Respiração de Cheyne-Stokes.
- c) Respiração de Kussmaul.
- d) Ortopneia.

9

(SESACRE/IBFC/2022) O garroteamento é feito para facilitar a visualização da veia, o garroteamento excessivo pode ser reconhecido pela coloração arroxeadada das extremidades dos dedos e da mão. Neste caso o garrote deve ser solto imediatamente para refazer o fluxo sanguíneo e melhorar a oxigenação local. Sobre o tempo do garroteamento, não deverá passar de:

- a) 30 (trinta) segundos.
- b) 5 (cinco) minutos.
- c) 1 (um) minuto.
- d) 2 (dois) minutos.

10

(SESACRE/IBFC/2022) Foi prescrita a posição _____, na qual o paciente deverá ser colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo inclinado, de forma que a cabeça fique em nível mais baixo em relação ao corpo. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Fowler.
- b) Trendelenburg.
- c) Genupeitoral.
- d) Litotomia.

11

(SESACRE/IBFC/2022) Assinale a alternativa que contemple um sinal e/ou sintoma sugestivo de violência em adultos (20 a 59 anos).

- a) Queixas crônicas específicas, com causa física óbvia.
- b) Gravidez desejada.
- c) Rapidez em iniciar o pré-natal.
- d) Desnutrição.

12

(SESACRE/IBFC/2022) No que se refere ao conteúdo microbiano de uma ferida, esta é considerada _____, quando o local apresenta intensa reação inflamatória e microrganismos que podem produzir exsudato purulento com

odor fétido. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) contaminada.
- b) infectada.
- c) potencialmente contaminada.
- d) limpa.

13

(SESACRE/IBFC/2022) Curativos _____, são métodos de primeira escolha em curativos para queimaduras. Suas vantagens são o auxílio na reepitelização, controle antimicrobiano e analgesia. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Hidrogel.
- b) Ácidos Graxos Essenciais (AGE).
- c) À base de prata.
- d) Hidrocolóides.

14

(SESACRE/IBFC/2022) Óleo vegetal composto de ácido linoléico, ácido caprílico, ácido cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja, é indicado para curativos. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de ferida que esse produto é contraindicado.

- a) Feridas oncológicas.
- b) Feridas abertas vitalizadas.
- c) Feridas não infectadas.
- d) Feridas em fases de granulação e epitelização.

15

(SESACRE/IBFC/2022) A papaína creme 10% é indicada para o tratamento do seguinte tipo de ferida: _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) dermatite associada à incontinência.
- b) queimaduras.
- c) lesões com necrose seca.
- d) úlcera venosa.

16

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre Doenças Diarréicas Agudas (DDAs), analise as afirmativas abaixo.

I. As DDAs correspondem a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais caracterizadas por uma síndrome, na qual ocorre a diminuição da

consistência das fezes, o aumento do número de evacuações (mínimo de 3 episódios em 24 horas) e, em alguns casos, há presença de muco e sangue (disenteria).

II. São autolimitadas, com duração de até 28 dias.

III. O quadro clínico pode evoluir para desidratação leve à grave. Quando tratadas incorretamente ou não tratadas, podem levar à desidratação grave e ao distúrbio hidroeletrólítico, podendo ocorrer óbito, principalmente quando associadas à desnutrição.

IV. O tratamento das DDAs é simples e fundamenta-se na rápida reidratação dos pacientes por meio da administração de líquidos e de solução de reidratação oral (SRO) ou fluidos endovenosos, dependendo da gravidade do caso.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) I apenas.
- d) I, II, III e IV.

17

(SESACRE/IBFC/2022) A dermatite de contato é uma reação inflamatória na pele decorrente da exposição a um agente capaz de causar irritação ou alergia. Sobre a dermatite de contato, assinale a alternativa correta.

- a) O irritante agressor deve ser identificado mas não removido; em geral, se utiliza sabão até que ocorra cicatrização das lesões.
- b) Os homens tendem a ser afetados mais comumente que as mulheres.
- c) É uma reação inflamatória da pele causada apenas por agentes químicos.
- d) Os fatores predisponentes consistem em extremos de calor e de frio, uso frequente de sabão e água e doença cutânea preexistente.

18

(SESACRE/IBFC/2022) A catarata é a maior causa de cegueira tratável nos países em desenvolvimento. Sobre Catarata, analise as afirmativas abaixo.

I. A catarata pode desenvolver-se em um ou em ambos os olhos e em qualquer idade.

II. Tabagismo, uso de corticosteroides a longo prazo (particularmente em altas doses), luz solar e radiação ionizante, diabetes melito, obesidade e lesões oculares podem aumentar o risco de catarata.

III. As manifestações clínicas da catarata são visão clara e dor ocular.

IV. Tratamentos não cirúrgicos eficazes como medicamentos, colírios e óculos, podem curar a catarata ou impedir o surgimento dessas relacionadas com a idade.

V. O tratamento clínico ótimo consiste em prevenção, incluindo instrução do cliente sobre as estratégias de redução de risco, como abandono do tabagismo e uso de óculos de sol em ambientes externos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, III e IV apenas.
- b) II, III e V apenas.
- c) I, II e V apenas.
- d) I, II, III, IV e V.

19

(SESACRE/IBFC/2022) O Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica caracteriza-se pela ingestão descontrolada de grande quantidade de alimentos, sem apetite e quase sem mastigar, até que seja alcançada a plenitude. Sobre o Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Este transtorno é caracterizado por compulsão alimentar em um curto espaço de tempo, seguida de angústia por essa atitude e ausência de comportamentos regulares voltados para a eliminação do excesso alimentar.

() Para a caracterização do diagnóstico, esses episódios devem ocorrer pelo menos quatro dias por semana no período de doze meses.

() Apesar de mais frequente em indivíduos obesos, ocorre também em pessoas com peso normal.

() Acomete indivíduos de todas as raças, com distribuição aproximada entre os sexos e início habitual na adolescência. Assinale a alternativa

que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - F.
- b) V - V - V - V.
- c) F - V - F - V.
- d) V - F - V - V.

20

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), analise as afirmativas abaixo.

I. Sobre a etiologia do autismo, diversos estudos apontam múltiplos fatores envolvidos, como lesões neurológicas perinatais, rubéola congênita, fenilcetonúria, esclerose tuberosa, alterações genéticas, incompatibilidade imunológica entre mãe e feto, sofrimento fetal e uso de medicamentos no período gestacional.

II. A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ou os conservantes utilizados em programas de imunização (timerosol) são grandes causadores de autismo em crianças.

III. A avaliação das características autísticas em uma criança não é clínica, mas sim realizada por exames específicos comprobatórios que orientam o diagnóstico.

IV. Os sintomas são contato visual anormal, atraso na linguagem, sendo os mais comuns e ecolalia (imediate ou posterior) e a inversão pronominal, a presença de estereotípias e o maneirismo, como a resistência às mudanças.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) I, III e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.

21

(SESACRE/IBFC/2022) _____ representa uma síndrome reversível específica à ingestão recente de determinada droga. Os critérios que a definem baseiam-se nas evidências recentes do uso e incluem comportamento inadequado, agressividade, labilidade de humor, prejuízo na coordenação psicomotora e julgamento de realidade, lentificação psicomotora e déficit

cognitivo. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) intoxicação por substâncias.
- b) abstinência de substâncias.
- c) abuso de substância.
- d) síndrome de dependência.

22

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre os pontos importantes que devem ser contemplados em qualquer check-list planejados pelos serviços de saúde para uma cirurgia segura. Analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Usar métodos para minimizar o risco de infecções de sítio cirúrgico.
 - () Preparar-se para identificar e agir em caso de grande perda sanguínea.
 - () Evitar induzir reações alérgicas ou à medicação que tragam riscos ao paciente.
 - () Proteger o paciente da dor, minimizando os riscos da anestesia. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- a) V - V - V - V. c) V - V - F - V.
b) V - V - V - F. d) V - F - V - V.

23

(SESACRE/IBFC/2022) As Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) encontram-se em terceiro lugar nas Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Assinale a alternativa que apresenta a definição de infecção de sítio cirúrgico incisional profunda.

- a) Ocorre no primeiro mês após o método cirúrgico e envolve a pele e o tecido subcutâneo.
- b) Ocorre no primeiro mês após a cirurgia ou até dois meses, se houver a utilização de implantes, envolve tecidos com textura mole.
- c) Ocorre no primeiro mês após a cirurgia ou até dois meses, se houver colocação de implantes, envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou empregada durante o processo cirúrgico.
- d) Ocorre no segundo mês após o método cirúrgico e envolve a pele e o tecido subcutâneo.

24

(SESACRE/IBFC/2022) De acordo com a classificação das cirurgias segundo o potencial de contaminação, assinale a alternativa que apresenta o que significa uma cirurgia potencialmente contaminada.

- a) São as cirurgias realizadas em qualquer tecido, na presença de processo infeccioso local.
- b) São realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso local.
- c) São as cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa, em tecidos cavitários com comunicação com o meio externo, ou de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local.
- d) São as cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana abundante, de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local.

25

(SESACRE/IBFC/2022) Cirurgia de urgência é o tratamento cirúrgico que requer pronta atenção. Assinale a alternativa que apresenta dentro de quanto tempo deve ser realizada a cirurgia de urgência.

- a) dentro de 12 a 24 horas.
- b) dentro de 24 a 48 horas.
- c) dentro de 24 a 36 horas.
- d) imediatamente.

26

(SESACRE/IBFC/2022) Paciente CCR, internado no leito 12, da unidade de Clínica Médica, foi prescrito 6.000.000 UI de Penicilina Cristalina (PC) para correr um volume total de 100 mL em uma hora. A Unidade dispõe de frasco-ampola de PC de 10.000.000 UI. Para o preparo deste medicamento, é necessário adicionar _____ de diluente ao frasco-ampola de PC e aspirar _____ para administrar a dose prescrita. O gotejamento do soro será de _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 5 mL / 3 mL / 99 gotas/minuto.

- b) 8 mL / 5 mL / 66 gotas/minuto.
- c) 6 mL / 6 mL / 33 gotas/minuto.
- d) 10 mL / 6 mL / 99 gotas/minuto.

27

(SESACRE/IBFC/2022) Foram prescritas 40 gotas de Dipirona a cada 6 horas se necessário, em ml (mililitro). O volume correspondente será de: _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 1 ml.
- b) 2 ml.
- c) 2,5 ml.
- d) 3 ml.

28

(SESACRE/IBFC/2022) Assinale a alternativa que apresenta quantas miligramas (mg) há em uma gota da medicação cloridrato de Clorpromazina 4%.

- a) 0,1 mg.
- b) 0,4 mg.
- c) 1 mg.
- d) 4 mg.

29

(SESACRE/IBFC/2022) Está prescrito 2 mg de morfina endovenoso, e o técnico de enfermagem diluiu para 10 ml uma ampola de morfina 10 mg/mL injetável - ampola 1mL. Assinale a alternativa que apresenta quantos ml deverão ser preparados para atender a prescrição médica.

- a) 1 ml.
- b) 1,5 ml.
- c) 2 ml.
- d) 2,5 ml.

30

(SESACRE/IBFC/2022) A transmissão da Hanseníase se dá por meio de uma pessoa doente que apresenta a forma infectante da doença (multibacilar – MB) e que, estando sem tratamento, elimina o bacilo por meio da via:

- a) sexual.
- b) gastrointestinal.

- c) respiratória.
- d) hematogênica.

31

(SESACRE/IBFC/2022) As infecções por dengue podem ser assintomáticas ou sintomáticas. Sobre as manifestações clínicas da dengue, assinale a alternativa correta.

- a) Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem na fase febril.
- b) Na fase febril, a primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38°C, de início abrupto e com duração de dois a sete dias, associada a cefaléia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-orbitária.
- c) É considerado um sinal de alarme da dengue a diminuição progressiva do hematócrito.
- d) É considerado um sinal de alarme da dengue apenas a hepatomegalia maior do que 10 cm abaixo do rebordo costal.

32

(SESACRE/IBFC/2022) O Soro Antirrábico (SAR) possui em sua composição uma solução concentrada e purificada de anticorpos obtidos a partir do soro de equinos imunizados com antígenos rábicos. Considerando o SAR, assinale a alternativa correta.

- a) O SAR deve ser utilizado em situação de reexposição ao vírus da raiva ou em caso de pessoas que já tenham feito seu uso anteriormente.
- b) Para sua conservação, manter entre 2°C e 8°C, sendo ideal a temperatura de 5°C. Não pode ser congelado, pois o congelamento provoca a perda de potência, forma agregados e aumenta o risco de reações.
- c) A dose é de 60 UI/kg de peso. A dose máxima é de 5.000 UI. A dose não pode ser dividida para ser administrada.
- d) Quando não se dispuser do soro ou de sua dose total, aplicar inicialmente a parte disponível no máximo em até trinta dias após a aplicação da primeira dose de vacina de cultivo celular, ou seja, após a aplicação da terceira dose da vacina.

33

(SESACRE/IBFC/2022) A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada por médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Sobre as doenças de notificação compulsória imediata, assinale a alternativa incorreta.

- a) Botulismo.
- b) Tularemia.
- c) Poliomielite.
- d) Esquistossomose.

34

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre a Síndrome do Corrimento Uretral Masculino, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A uretrite é uma inflamação da uretra, podendo ser dividida em dois grupos: uretrites gonocócicas e não gonocócicas, infecciosas ou não.
- () O ser humano é o único hospedeiro.
- () Os casos de corrimento uretral identificados nas unidades sentinelas devem ser notificados somente após a verificação do agente etiológico.
- () Não é considerada doença de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - F - V. c) V - F - V - F.
- b) V - V - F - F. d) V - F - V - V.

35

(SESACRE/IBFC/2022) A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. Sobre essa doença, analise as afirmativas abaixo.

- I. A transmissão por transfusão de sangue ou derivados pode ocorrer, mas se tornou muito rara, devido ao controle e à testagem do sangue doado pelos hemocentros.
- II. A transmissão sexual é a predominante. Os sítios de inoculação do *T. pallidum* são, em geral, os órgãos genitais, podendo ocorrer também

manifestações extragenitais (lábios, língua e áreas da pele com solução de continuidade).

III. A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas).

Estão corretas as afirmativas:

- a) III apenas.
- b) II e III apenas.
- c) II apenas.
- d) I, II e III.

36

(SESACRE/IBFC/2022) As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros microorganismos. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O uso de preservativos em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV/aids e das hepatites virais B e C.
- () Doença Inflamatória Pélvica (DIP) acontece principalmente quando a gonorreia e a infecção por clamídia não são tratadas.
- () A camisinha masculina ou feminina pode ser adquirida gratuitamente nas unidades de saúde.
- () As parcerias sexuais devem ser alertadas sempre que uma infecção sexualmente transmissível for diagnosticada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V.
- b) V - V - V - F.
- c) V - V - F - V.
- d) V - V - F - F.

37

(SESACRE/IBFC/2022) A Profilaxia Pós Exposição (PEP) é uma medida de prevenção ao HIV em casos de exposição ao vírus como, a camisinha sair, romper ou não ter sido utilizada no ato sexual, em casos de violência sexual e acidentes ocupacionais. A prevenção é feita por meio do uso de medicamentos antirretrovirais, que impedem o vírus de se estabelecer no organismo. Por isso, é importante iniciar a profilaxia em até

_____, de preferência, nas _____ primeiras horas após a exposição. A PEP é gratuita e tem duração de _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 72 horas / seis / 30 dias.
- b) 72 horas / duas / 28 dias.
- c) 24 horas / quatro / 28 dias.
- d) 12 horas / duas / 30 dias.

38

(SESACRE/IBFC/2022) Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na Norma Brasileira (NBR) 9191 e devem ser preenchidos até _____ de sua capacidade. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) metade.
- b) 1/3 (um terço).
- c) 2/3 (dois terços).
- d) 2/4 (dois quartos).

39

(SESACRE/IBFC/2022) As precauções de contato são medidas aplicadas para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos, através de contato direto ou indireto com o paciente ou ambiente. Analise as afirmativas a seguir sobre o assunto.

I. Quarto privativo ou coorte com pacientes apresentando infecção ou colonização pelo mesmo patógeno e, se não for possível, manter paciente em leito nas extremidades da unidade com identificação.

II. Avental e luvas de uso único antes de entrar em contato com o paciente ou material infectante.

III. Uso de artigos (estetoscópio, aparelho de pressão, termômetros) individualizado para o paciente ou, se não for possível, proceder à desinfecção.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I, II e III.

40

(SESACRE/IBFC/2022) A Tuberculose é considerada pela Organização Mundial da Saúde

como a doença infecciosa bacteriana de agente único que mais mata no mundo, os aerossóis contendo os bacilos da tuberculose podem permanecer no ambiente entre _____, dependendo da precariedade de sua ventilação e iluminação. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 5 a 12 horas.
- b) 2 a 6 horas.
- c) 6 a 24 horas.
- d) 12 a 36 horas.

41

(SESACRE/IBFC/2022) A higienização das mãos sempre exerceu um papel preponderante no controle de infecções. Quanto aos produtos utilizados para higienização das mãos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os álcoois têm pouca atividade contra os esporos e oocistos de protozoários
- b) Os álcoois têm atividade residual apreciável
- c) A clorexidina apresenta boa atividade contra bactérias Gram-positivas
- d) Os álcoois têm rápida ação microbicida, quando aplicados à pele

42

(SESACRE/IBFC/2022) Hemocultura é o exame realizado com o objetivo de isolar e identificar microrganismos patogênicos no sangue de um paciente que se supõe ter uma infecção. É um exame auxiliar relevante, pois seu resultado reflete diretamente na terapêutica. Com relação à hemocultura, analise as afirmativas a seguir.

I. Ao remover o selo da tampa do frasco de hemocultura, fazer antisepsia na tampa com álcool a 70%.

II. Caso o médico não indique intervalos de tempos de coleta, deve-se preferencialmente, coletar antes da antibioticoterapia e fora do pico febril.

III. Identificar as amostras com etiqueta contendo o nome completo e legível, data de nascimento e hora da coleta. Para frascos de hemoculturas contendo código de barras, não se deve colocar por cima, a etiqueta de identificação do paciente.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

43

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre a Norma Regulamentadora 32, assinale a alternativa incorreta.

- a) É proibido fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se.
- b) É vedado: iniciar qualquer atividade na falta de Equipamento de Proteção Individual.
- c) Locais com gases e vapores anestésicos devem ser providos de ventilação e exaustão adequados.
- d) É permitida a instalação de no máximo dois equipamentos de raios X por sala.

44

(SESACRE/IBFC/2022) O processamento de produtos constitui a prática de descontaminar e preparar produtos utilizados no apoio ao diagnóstico e terapia e na assistência aos pacientes, como cirurgias, procedimentos e alguns tipos de exames, de forma a garantir a reutilização ou descarte seguro destes produtos em serviços prestados por profissionais de saúde em hospitais, clínicas, consultórios médicos, odontológicos, entre outros. Sobre o processamento dos produtos para saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O Serviço de Saúde não será corresponsável pela segurança do processamento dos produtos para saúde, realizado por empresa processadora por ele contratada.
- b) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, deverão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
- c) O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área limpa para a área suja.

d) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza.

45

(SESACRE/IBFC/2022) Assinale a alternativa que contemple um material de saúde do tipo crítico.

- a) Cânula de Guedel.
- b) Comadres.
- c) Vidraria para aspiração.
- d) Copos e talheres.

46

(SESACRE/IBFC/2022) A limpeza concorrente é executada no término de cada cirurgia. Envolve procedimentos de retirada dos artigos sujos da sala, limpeza das superfícies horizontais dos móveis e equipamentos. Diante o exposto, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() O instrumental cirúrgico deve ser colocado aberto em caixas perfuradas (usando luvas) e encaminhado ao expurgo da central de materiais e esterilização (CME), o mais cedo possível para o reprocessamento.

() As cânulas endotraqueais devem ser desprezadas após o uso.

() Usar hipoclorito de sódio em superfícies metálicas.

() Artigos em aço inoxidável, de vidro, de borracha, utilizados na cirurgia recebem cuidados especiais.


Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V.
- b) V - F - V - F.
- c) V - V - F - V.
- d) F - V - V - F.

47

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre a esterilização dos produtos para saúde realizada em Centro de Material e Esterilização (CME), assinale a alternativa correta.

a) É obrigatório realizar o ciclo de esterilização a vapor para uso imediato, no primeiro ciclo do dia.



Fonte: <https://www.ambulance technicians study.co.uk/rhythms.html>
 apud Camparo, CRV; e col. Guia de bolso para assistência de
 Enfermagem em Emergência (2017), pag.63

- a) Fibrilação ventricular.
- b) Bloqueio atrioventricular de 2º grau.
- c) Taquicardia ventricular monomórfica.
- d) Bradicardia sinusal.

54

(SESACRE/IBFC/2022) O tratamento eficaz para o envenenamento por serpente é com soro antiofídico, que é específico para cada tipo (gênero) de serpente. Quanto antes for iniciada a terapia com soro, menor será a chance de haver complicações. Assinale a alternativa que apresenta o soro indicado para envenenamento pela espécie surucucu.

- a) Antibotrópico.
- b) Anticrotálico.
- c) Antielapídico.
- d) Antilaquetico.

55

(SESACRE/IBFC/2022) Em casos de suspeita de intoxicação exógena por analgésicos opiáceos, assinale a alternativa que apresenta qual antídoto deve ser utilizado.

- a) Flumazenil.
- b) Atropina.
- c) Naloxona.
- d) Acetilcisteína.

56

(SESACRE/IBFC/2022) _____ é uma lesão dos tecidos moles produzida por uma força não penetrante (como por exemplo pancada, chute ou queda), causando ruptura dos vasos sanguíneos de pequeno calibre, com sangramento nos tecidos moles (equimoses). Observa-se o desenvolvimento de hematoma quando o sangramento é suficiente para causar acúmulo apreciável de sangue, produzindo aspecto característico de “lesão arroxçada”. Sua

resolução ocorre em 1 a 2 semanas. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Estiramento.
- b) Entorse.
- c) Contusão.
- d) Luxação articular.

57

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre tipos de queimadura indolor, analise as afirmativas a seguir.

- I. Queimadura de primeiro grau.
- II. Queimadura de segundo grau.
- III. Queimadura de terceiro grau.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e III apenas.

58

(SESACRE/IBFC/2022) Considerando a Resolução nº 509/2016, que trata da Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do Responsável Técnico, assinale a alternativa correta.

- a) A Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) é um documento emitido pelo Conselho Federal de Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem.
- b) O Responsável Técnico deve ser profissional de nível superior da área da Saúde, preferencialmente da Enfermagem.
- c) O Responsável Técnico tem sob sua responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem.
- d) A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) terá validade de 24 meses; e a Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) terá validade de 5 (cinco) anos.

59

(SESACRE/IBFC/2022) O técnico de Enfermagem assumiu plantão às 19 horas para cumprir a jornada noturna de 12 horas. Após o recebimento do plantão, já havia passado por outra jornada diurna de trabalho e se encontrava exausto, desta forma foi descansar na sala de TV e acabou cochilando e deixando de fazer as medicações e realizar o controle dos sinais vitais das 20 horas dos pacientes da unidade. Por volta das 23 horas o paciente RTF, 59 anos, apresentou parada cardiorrespiratória sendo atendido pelo médico, porém acabou indo à óbito. Foi constatado pelo médico que o paciente apresentou PCR por não ter recebido o medicamento prescrito e não ter realizado o controle dos sinais vitais do paciente pelo técnico de enfermagem. Considerando a falha do profissional no aspecto ético, é correto afirmar que trata-se de:

- a) Negligência.
- b) Imprudência.
- c) imperícia.
- d) homicídio culposo.

60

(SESACRE/IBFC/2022) Um paciente de 28 anos foi transportado em maca, sem grades de proteção, da enfermaria ao serviço de radiologia para realização de RNM (Ressonância Nuclear Magnética), estava acompanhado por equipe de enfermagem, seus sinais vitais estavam monitorados, paciente consciente, com períodos de agitação. Durante o trajeto o paciente caiu da maca, causando traumas leves no mesmo. De acordo com o código de ética de enfermagem, assinale a alternativa que apresenta qual tipo de infração a equipe incorreu neste caso.

- a) Imperícia.
- b) Imprudência.
- c) Negligência.
- d) Não configura infração.

61

(SESACRE/IBFC/2022) Hospitais magnéticos caracterizam-se pela plena estrutura organizacional, que fornece subsídios ao

desenvolvimento do profissional, a partir do investimento em formação e em educação permanente. Dessa forma, possibilita tomada de decisão baseada em evidências. Considerando características-chave de um hospital magnético, assinale a alternativa correta.

- a) O médico é responsável pelas atividades relacionadas ao cuidado do paciente, sendo que o Enfermeiro não possui autonomia por sua prática.
- b) Estrutura organizacional centralizada, permitindo maior controle sobre o ambiente de trabalho imediato e forte envolvimento da enfermagem na estrutura central da instituição.
- c) Estilo de administração participativo, caracterizado pelo envolvimento da equipe em todos os níveis.
- d) Os Enfermeiros não possuem permissão para desenvolver o julgamento independente.

62

(SESACRE/IBFC/2022) A prática do trabalho em equipe de saúde e de Enfermagem teve seu início em 1950, em um cenário de mudanças das concepções de saúde e doença e, do modo de organização dos serviços de saúde. Considerando a organização de trabalho por equipe denominada integração, assinale a alternativa correta.

- a) Almeja a articulação das ações e de interação dos profissionais.
- b) Ocorre justaposição das ações, permitindo exclusivamente o agrupamento de agentes envolvidos.
- c) Ocorre polarização de uma parte do grupo, com tendência a especialização das ações.
- d) Ocorre a desfragmentação das ações, por formação de pequenos grupos especializados.

63

(SESACRE/IBFC/2022) Assinale a alternativa que apresenta qual o objetivo do Programa de atenção Integral à Saúde do Idoso.

- a) Aprimorar, manter e recuperar a capacidade funcional.

- b) Oferecer atendimento adequado com uma equipe multiprofissional e atenção integral à saúde do Idoso.
- c) A promoção de saúde, qualidade de vida, assistência e reabilitação.
- d) Valorizar a independência física e mental da pessoa idosa, redescobrimdo possibilidades de viver sua própria vida, como também a fase do ciclo vital, com a melhor qualidade possível.

64

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre Educação em Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A educação na saúde consiste na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular.

() Também conhecida como educação no trabalho em saúde, a educação na saúde apresenta apenas a modalidade de educação continuada.

() A educação continuada contempla as atividades que possui período definido para execução e utiliza, em sua maior parte, os pressupostos da metodologia de ensino tradicional, como exemplo as ofertas formais nos níveis de pós-graduação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - V.
- b) V - V - F.
- c) V - F - V.
- d) F - F - V.

65

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre a vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenza B (conjugada), ou seja, vacina Penta, assinale a alternativa correta.

a) Na rotina dos serviços, a vacina penta está disponível para crianças até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias.

b) Na rotina dos serviços, a vacina penta está disponível para crianças até 7 (sete) anos 11 meses e 29 dias.

c) Na rotina dos serviços, a vacina penta está disponível para crianças até 5 (cinco) anos 11 meses e 29 dias.

d) Na rotina dos serviços, a vacina penta está disponível para crianças até 6 (seis) anos 11 meses e 29 dias.

66

(SESACRE/IBFC/2022) A presença de _____, apesar de ser um evento raro, pode ocorrer após a administração da vacina contra rotavírus. Mesmo assim, o técnico de enfermagem que administrou a dose da vacina deve orientar a pessoa sobre a possibilidade de ocorrência. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Febre.
- b) Irritabilidade.
- c) Sangue nas fezes.
- d) Vômitos.

67

(SESACRE/IBFC/2022) A vacina atenuada é aquela em que o vírus está ativo, porém, sem capacidade de produzir a doença. Assinale a alternativa que não é exemplo de vacinas atenuadas.

- a) Vacina contra caxumba.
- b) Vacina contra febre amarela.
- c) Vacina contra poliomielite oral – VOP.
- d) Vacina contra gripe.

68

(SESACRE/IBFC/2022/**Atualizada**) A vacina HPV quadrivalente está aprovada no Brasil para prevenção de lesões genitais pré-cancerosas de colo do útero, de vulva e de vagina em mulheres, de pênis em homens e anal em ambos os sexos, relacionadas aos HPV 16 e 18, e verrugas genitais em mulheres e homens, relacionadas aos HPV 6 e 11. Considerando o esquema de vacina do HPV, assinale a alternativa correta.

a) O esquema da vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante), ou seja, vacina

HPV, é administrar 2 (duas) doses, com intervalo de 6 (seis) meses entre as doses, em meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).

b) O esquema da vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante), ou seja, vacina HPV, é administrar 3 (três) doses, com intervalo de 6 (seis) meses entre as doses, nas meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias)

c) O esquema da vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante), ou seja, vacina HPV, é administrar 3 (três) doses, com intervalo de 3 (três) meses entre as doses, nas meninas e meninos de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias)

d) O esquema da vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante), ou seja, vacina HPV, é administrar 2 (duas) doses, com intervalo de 30 (trinta) dias entre as doses, nas meninas de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias) e nos meninos de 12 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).

69

(SESACRE/IBFC/2022) A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. Sobre a vacina da Febre Amarela, analise as afirmativas abaixo.

I. Crianças que iniciaram o esquema primário após 5 (cinco) meses de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose.

II. A vacina febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a maioria das vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, sem necessidade de qualquer intervalo, exceto com as vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) em crianças menores de 2 (dois) anos de idade. Neste caso, deve ser respeitado o intervalo de 30 dias entre as duas vacinas (mínimo de 15 dias), salvo em

circunstâncias específicas, a serem discutidas entre as três esferas do Sistema Único de Saúde.

III. Em situações onde exista o risco epidemiológico concomitante para febre amarela e os vírus contidos na vacina tríplice viral, o risco da não vacinação é maior que a possibilidade da diminuição da resposta imune. Dessa forma a vacinação simultânea deverá ser realizada sem levar em conta o intervalo entre as doses.

IV. Considera-se uma contraindicação da vacina da Febre Amarela os pacientes submetidos a transplante de órgãos sólidos.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e IV apenas.

b) I e II apenas.

c) II, III e IV apenas.

d) I, II, III e IV.

70

(SESACRE/IBFC/2022) O exame citopatológico é o método do rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil. Sobre a coleta do material para o exame citopatológico do colo do útero, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâmina única. A amostra de fundo de saco vaginal é sempre recomendada, pois o material coletado é de alta qualidade para o diagnóstico oncótico.

() A recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas. Na prática a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica.

() O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. Deve-se aguardar o quinto dia após o término da menstruação.

() No caso de sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico pode ser dispensado e a coleta não deve ser realizada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) F - V - V - F.

- b) V - V - V - V.
- c) V - F - V - F.
- d) F - V - F - V.

71

(SESACRE/IBFC/2022) O câncer de mama é o crescimento descontrolado de células da mama que adquiriram características anormais (células dos lobos, células produtoras de leite, ou dos ductos, por onde é drenado o leite), anormalidades estas causadas por uma ou mais mutações no material genético da célula. Sobre o câncer de mama, analise as afirmativas abaixo.

I. Os principais fatores de risco conhecidos para o câncer de mama estão ligados à idade, aos fatores genéticos e aos endócrinos.

II. Os fatores endócrinos estão relacionados principalmente ao estímulo estrogênico, seja endógeno ou exógeno, com aumento do risco quanto maior for o tempo de exposição.

III. Possuem risco aumentado as mulheres com história de menarca tardia (idade da primeira menstruação maior que 12 anos), menopausa precoce (instalada antes dos 45 anos de idade), primeira gravidez após os 25 anos, multiparidade e terapia de reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se prolongada por mais de dez anos.

IV. São manifestações clínicas do câncer de mama: nódulo palpável, endurecimento da mama, secreção mamilar e retração ou abaulamento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV apenas.
- b) I, III e IV apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.

72

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre o uso de método anticoncepcional durante o aleitamento materno, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Durante os primeiros seis meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorreia, está associada à diminuição da fertilidade.

() O efeito inibidor da fertilidade (que o aleitamento exclusivo com amenorreia tem) pode ser utilizado como método comportamental de anticoncepção, chamado de LAM (método da amenorreia da lactação).

() O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal devem ser utilizados em lactantes, pois não interferem na qualidade e na quantidade do leite materno e não afetam adversamente a saúde do bebê.

() O dispositivo intrauterino (DIU) pode ser inserido imediatamente após o parto ou a partir de quatro semanas pós-parto. O DIU está contraindicado para os casos que cursaram com infecção puerperal até três meses após a cura.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - V.
- b) V - V - V - V.
- c) V - F - V - F.
- d) F - V - F - V.

73

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre as condutas que o enfermeiro deve ter perante as queixas mais comuns na gestação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() Na queixa de corrimento vaginal, deve-se prescrever cremes vaginais, mesmo que não haja diagnóstico de infecção vaginal.

() Na queixa de pirose, deve-se orientar a gestante a consumir dieta fracionada, evitando frituras, café, chá preto, mates, doces, álcool e fumo.

() Na queixa de sialorreia, deve-se orientar que é um sintoma comum no início da gestação e orientar a gestante a deglutir a saliva e tomar líquidos em abundância (especialmente em épocas de calor).

() Na queixa de fraquezas e desmaios, deve-se orientar a gestante para que não faça mudanças bruscas de posição e evite a inatividade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F.
- b) V - V - V - V.
- c) F - V - F - V.

d) F - V - V - V.

74

(SESACRE/IBFC/2022) O _____ é quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões) e sucos de frutas. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) aleitamento materno misto ou parcial.
- b) aleitamento materno exclusivo.
- c) aleitamento materno complementado.
- d) aleitamento materno predominante.

75

(SESACRE/IBFC/2022) Algumas medidas podem ser úteis para aumentar a produção do leite materno. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Diminuir a frequência das mamadas.
- b) Dar tempo para o bebê esvaziar bem as mamas.
- c) Oferecer apenas uma das mamas em cada mamada.
- d) Após a mamada, não ordenhar o leite residual.

76

(SESACRE/IBFC/2022) O conhecimento do desenvolvimento normal da criança possibilita a identificação de atrasos, desvios e transtornos que permeiam o processo biopsicossocial. O _____ é desencadeado por algum estímulo brusco como bater palmas, estirar bruscamente o lençol onde a criança está deitada ou soltar os braços semiesticados quando se faz a avaliação da preensão palmar. O reflexo consiste em uma resposta de extensão-abdução dos membros superiores (eventualmente dos inferiores), ou seja, na primeira fase os braços ficam estendidos e abertos, com abertura dos dedos da mão, e em seguida de flexão-adução dos braços, com retorno à posição original. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) reflexo abstrato.
- b) reflexo de Moro.
- c) reflexo da comunicação.
- d) reflexo de Bournout.

77

(SESACRE/IBFC/2022) No que diz respeito à gestão de pessoal e as normas previstas na Resolução nº 63 de 2011 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assinale a alternativa correta.

- a) As exigências referentes aos recursos humanos do serviço de saúde incluem profissionais de nível superior, apenas, podendo ser de quadro próprio ou terceirizado.
- b) Não há necessidade de disponibilização dos registros de formação e qualificação dos profissionais, desde que desempenhem adequadamente as suas funções.
- c) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda.
- d) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais durante e após o início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.

78

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre a vigilância epidemiológica das doenças e agravos relacionados ao trabalho, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() As intoxicações exógenas suspeitas e confirmadas relacionadas ao trabalho devem ser notificadas em ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

() A notificação das doenças e dos agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de Notificação tem caráter estritamente epidemiológico e de vigilância.

() O prazo para encerramento das investigações dos casos notificados de doenças e agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de Notificação é de no máximo 30 dias da notificação.

() No processo de Vigilância em Saúde do Trabalhador, a instituição de medidas de controle para saúde e segurança dos trabalhadores deve ocorrer assim que haja suspeição da relação do evento com o trabalho e

que as situações de risco aos trabalhadores forem identificadas, visando a intervenção nos ambientes e processos de trabalho, evitando a ocorrência de novos casos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - V.
- b) V - V - V - V.
- c) F - V - F - V.
- d) V - F - V - F.

79

(SESACRE/IBFC/2022) A Resolução nº 36/2013 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. De acordo com a mencionada resolução, assinale a definição de gestão de risco.

- a) Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
- b) Componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados.
- c) Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
- d) Totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem.

80

(SESACRE/IBFC/2022) A Política Nacional de Atenção Básica, como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, recomenda que a população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) seja de _____ pessoas,

localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 500 a 1.500.
- b) 7.000.
- c) 1.000.
- d) 2.000 a 3.500.

81

(SESACRE/IBFC/2022) A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) define responsabilidades institucionais para a implantação e implementação das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e orienta que estados, distrito federal e municípios instituam suas próprias normativas trazendo para o Sistema Único de Saúde (SUS) práticas que atendam às necessidades regionais. Uma das PICS é _____, que é uma prática de imposição de mãos que usa a aproximação ou o toque sobre o corpo da pessoa com a finalidade de estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde. Baseado na concepção vitalista de saúde e doença também presente em outros sistemas terapêuticos, considera a existência de uma energia universal canalizada que atua sobre o equilíbrio da energia vital com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente de forma integral.

- a) Yoga.
- b) Shantala.
- c) Quiropraxia.
- d) Reiki.

82

(SESACRE/IBFC/2022) Sobre o Programa Telessaúde Brasil Redes, analise as afirmativas abaixo.

I. É uma iniciativa em âmbito nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da informação, que oferecem condições para promover a Teleassistência e a Teleducação.

II. Quanto à estrutura, o Telessaúde Brasil Redes é integrado por gestores da saúde, instituições formadoras de profissionais de saúde e serviços de saúde do SUS.

III. Quanto aos serviços, a Tele-educação é um serviço autônomo que utiliza as tecnologias de informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distância e temporal.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III apenas.
- b) I apenas.
- c) I e II apenas.
- d) I, II e III.

A COLEÇÃO MAIS COMPLETA DO BRASIL

